

Argyreia (Argyreja)

čeleď: Convolvulaceae

Roste v tropické Asii v podobě bohatých ovíjivých popínavek. Stonky bývají tlusté a dřevnaté. Listy jsou stříbřité, široké a na spodní straně ochlupené. Květenství se objevuje v paždí listů. Plodem je červená, fialová nebo žlutá bobule s kožovitým nebo dřevitým obalem.

Vyhovuje ji plné slunce a vlhká půda.

Množí se semeny nebo řízky.

Argyreia acuta

Argyreia androyensis

Argyreia baoshanensis

Argyreia baronii

Argyreia capitiformis

Argyreia cheliensis

Argyreia eriocephala

Argyreia formosana

Argyreia fulvocymosa

Argyreia fulvovillosa

Argyreia henryi

Argyreia lineariloba

Argyreia marlipoensis

Argyreia mastersii

Argyreia maymyo

Argyreia mollis

oblasti: Írán

Argyreia monglaensis

Argyreia monosperma

Argyreia nervosa (Stríbrobýl)

synonyma: A. speciosa, Convolvulus nervosus, Convolvulus speciosus, Rivea nervosa

oblasti: Bangladéš, Florida, Havajské ostrovy, Indie, Pákistán, Portoriko

Roste v Indii a Bangladéši v podobě ovíjivého keře dorůstajícího do výšky i více než 10m. Mladé výhony má chlupaté. Střídavé listy mají velký srdčitý tvar se špičkou, tmavě zelenou spíše matnou barvu, délku (10 -) 18 - 27 (i 30)cm a šířku 8 - 25cm, spodní strana je šedá, bíle plstnatá s vystouplou žilnatinou. Kvete na stopce kalíškově zvonovými a trubkovitými květy s průměrem 5cm s vnitřní stranou růžovou, vnější bílou, kališní lístky jsou široce vejčité, bíle ochlupené, dlouhé 1,5 - 2cm, koruna má růžovofialový pysk s tmavším hrdlem a délku 6 - 7cm. Plody mají kulatý tvar velikosti 1 - 1,5 (i 2)cm a žlutohnědou barvu a obsahuje hnědá semena.

Argyreia onilahiensis

Argyreia osyrensis

Argyreia pierreana

Argyreia roxburghii

Argyreia splendens

Argyreia strigillosa

Argyreia vahibora

Argyreia velutina

Argyreia wallichii

Další informace:

<http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3rarn.html>

<https://www.rostliny.net/>