

Trichosanthes (Trichosanthes)

čeleď: Cucurbitaceae

Existuje asi 40 druhů. Pochází zřejmě z jihovýchodní a jižní Asie. Najdou se zde jednoletky i víceletky a všechny jsou popínavé byliny. Lísty má obvykle laločnaté, květy bílé s nitkovitými úkrojky na koncích okvětních lístků. Plodem je bobule.

Potřebuje teplo, půdu bohatou na živiny a dostatek závlivky.

Množí se semeny.

Trichosanthes anguina (Hadí tykev)

oblasti: Malajsie

Patří mezi jednoletky. Lísty má 5 - 7milaločnaté, tmavězelené. Květy mají v průměru 4cm, jsou 5tičetné a konce okvětních lístků jsou jemně pavučincovitě roztřepené. Plodem je až 1,8m dlouhá bobule o průměru 5 - 6cm barvy nejdříve zelené, ve zralosti žlutooranžové. Protože je obvykle různě zakřivená, říká se jí hadí. Semena jsou uložena v červeném míšku.

Trichosanthes baviensis

Trichosanthes cucumerina (Chlupokvět dýňovitý)

oblasti: Florida, JV Asie, S Austrálie

Pochází z jihovýchodní Asie a severní Austrálie.

Trichosanthes cucumeroides (Trichosanthes chichinda)

oblasti: Nepál, Pákistán, S Austrálie

Roste v tropech celého světa a Pěstuje se od Pákistánu po Nepál a dále v severní Austrálii. Roste v podobě plazivého či popínavého keře. Dosahuje výšky až 6m. Roste rychle, ovšem život má krátký. Chlupaté dlanité listy mají 3 - 7 hlubokých laloků s vroubkovanými okraji. Celková délka dosahuje 5 - 15cm a stejně tak i šířka. Kvete v hroznech jednopohlavnými bílými květy s 5ti okvětními lístky o celkovém průměru 3 - 4,5cm. Z okvětních lístků z okrajů vyrůstají jemné chlupaté zakroucené žilky. Plody mají různé tvary, většinou vřetenovitý tvar délky až 6cm, ve zralosti červené až červenooranžové barvy.

Trichosanthes dioica (Parval)

Patří mezi trvalky.

Trichosanthes dunniana

Trichosanthes fissibracteata

Trichosanthes homophylla

Trichosanthes kerrii

Trichosanthes kirilowii

oblasti: Japonsko, Korea

Pěstuje se v Koreji a Japonsku. Používá se v tradiční čínské medicíně. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. japonica

Trichosanthes laceribractea

Trichosanthes lepiniana

Trichosanthes ovigera

Trichosanthes pedata

Trichosanthes quinquangulata

Trichosanthes rosthornii

Používá se v tradiční čínské medicíně.

Trichosanthes rubiflos

Trichosanthes rugatisemina

Trichosanthes sericeifolia

Trichosanthes subrosea

Trichosanthes subvelutina

Trichosanthes tricuspidata

Trichosanthes truncata

Trichosanthes villosa

Trichosanthes wallichiana

<https://www.rostliny.net/>