

Fuirena

čeled': Cyperaceae

Fuirena abnormalis

Fuirena angolensis

Fuirena arenosa

Fuirena bernieri

Fuirena bidgoodiae

Fuirena boreocoerulescens

Fuirena breviseta

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína, Texas, Virginie

Fuirena bullifera

Fuirena bushii

oblasti: Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas

Fuirena camptotricha

Fuirena ciliaris

Fuirena claviseta

Fuirena coerulescens

oblasti: Virginie

Fuirena cuspidata

Fuirena ecklonii

Fuirena enodis

Fuirena felicis

Fuirena friesii

Fuirena gracilis

Fuirena hirsuta

Fuirena incompleta

Fuirena incrassata

Fuirena lainzii

Fuirena leptostachya

Fuirena longa

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, Texas

Fuirena microcarpa

Fuirena moritziana

Fuirena mutali

Fuirena nudiflora

Fuirena nyasensis

Fuirena obcordata

Fuirena ochreatea

Fuirena oedipus

Fuirena pachyrrhiza

Fuirena ponmudiensis

Fuirena pubescens

oblasti: Afganistán, Andalusie, Itálie, Jihoafrická Republika (JAR), Libanon, Pákistán, Portugalsko, Středozeří, SZ Indie, Turecko

Roste od Portugalska po Indii a v Africe jako trvalka. Dorůstá výšky 25 - 50 (i 75)cm. Pod zemí vytváří vodorovný oddenek. Stonek je 3hranný, průměru 1,5 - 2mm, má 4 - 7 článků, přízemní je krátký, vrcholové jsou ochlupené. Vytváří 4 - 7 listů, spodní bývají bez čepele, spodní pochvy jsou dlouhé 1cm, ostatní jsou ochlupené, dlouhé do 5cm, čepel je špičatá, kýlnatá, šedozelená, dlouhá do 20cm, široká 2 - 5mm a spodní strana ochlupená. Květenství tvoří 4 přisedlé klásky, spodní je krátce stopkatý, listeny uťaté, delší klásků, vlastní klásky jsou dlouhé 0,7 - 1cm a široké 4mm.

Fuirena pumila

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Jersey, New York, Ontario, Rhode Island, Severní Karolína, Texas, Virginie, Wisconsin

Fuirena quercina

Fuirena repens

Fuirena rhizomatifera

Fuirena robusta

oblasti: Portoriko

Fuirena sagittata

Fuirena scirpoidea

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína, Texas

Fuirena simplex

oblasti: Arizona, Arkansas, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

Fuirena simpsonii

Fuirena somaliensis

Fuirena squarrosa

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey, New York, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Fuirena stephani

Fuirena striatella

Fuirena stricta

Fuirena subdigitata

Fuirena swamyi

Fuirena tenuis

Fuirena trilobites

Fuirena tuwensis

Fuirena umbellata

oblasti: Etiopie, Filipíny, Florida, Indonésie, J Brazílie, J Čína, J Indie, J Japonsko, Jihoafrická Republika (JAR), Madagaskar, Malajsie, Melanésie, Nová Guinea, Portoriko, S Austrálie, Senegal, Srí Lanka, Tchaj-wan, Tichý oceán

Roste v tropech od Floridy po Brazílii, od Senegalu po Etiopii a JAR a dále na Madagaskaru, Mauriciu, Srí Lance, v Indii, Malajsii, Číně, Tchaj-wanu, Japonsku, Filipínách, v Indonésii a Austrálii jako trvalka. Pod zemí vytváří plazivý oddenek. Dorůstá výšky 0,6 - 1,2m. Lodyha je přímá, 5tihranná a pod květenstvím může být ochlupená. Listy vyrůstají střídavě, jsou úzce kopinaté, mohou být ochlupené, dlouhé 10 - 20cm, široké 0,9 - 1,9cm a vyrůstají z pochvy o délce 1,2 - 6,5cm. Květenstvím je lata složená z klásků ve 4 - 20ti strboulech, spodní listeny jsou listovité, vyšší šídlovité, strbouly mají průměr 1,5 - 2,5cm a tvoří je 6 - 15 klásků vejčitého až eliptického tvaru s délkou 0,7 - 1,2cm, plevy jsou eliptické, dlouhé 2mm a vykrojené. Plodem je obvejčitá hnědá nažka délky 1mm.

Vyhovují ji mokřady a okraje vodních ploch.

Fuirena uncinata

Fuirena welwitschii

Fuirena zambesiaca

Další informace:

<https://botany.cz/cs/fuirena-umbellata/>

<https://www.rostliny.net/>