

Drimys (Rozpylec)

čeleď: Winteraceae

Roste zejména v Austrálii a Malajsii, dále pak od Mexika po Patagonii v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Borka je světlá, hladká a aromatická. Listy jsou střídavé, aromatické a průsvitně tečkované. Kvete malými oboupohlavnými dvoudomými květy ve vrcholcích, okolících anebo samostatně, kališní i korunní lístky jsou v přeslenech a koruna je žlutá, bílá nebo růžová. Plodem je souplodí z růžově fialových až černých bobulí a obsahují lesklá semena. Nejznámějším druhem je *D. winteri*.

Vyhovují mu chráněná místa na plném slunci nebo v polostínu a vlhká dobře propustná lehká půda bohatá na živiny.

Množí se řízkou, hřížením nebo semeny.

Drimys andina

synonyma: *D. winteri* f. *andina*, *D. winteri* var. *andina*, *D. winteri* var. *quinoensis*

oblasti: Čile

Pochází z Čile.

Drimys brasiliensis

synonyma: *D. brasiliensis* subsp. *brasiliensis*, *D. brasiliensis* var. *campestris*, *D. brasiliensis* var. *montana*, *D. brasiliensis* var. *retorta*, *D. granadensis* var. *campestris*, *D. retorta*, *D. winteri* f. *revoluta*

oblasti: J Brazílie, J Mexiko, S Jižní Amerika, Střední Amerika

Roste od jižní Brazílie po jižní Mexiko.

Drimys confertifolia

synonyma: *D. fernandeziana*, *D. winteri* var. *confertifolia*, *D. winteri* var. *fernandeziana*

oblasti: Tichý oceán

Pochází z ostrovů Juana Fernandéze.

Drimys granadensis

synonyma: *D. granadensis* var. *grandiflora*, *D. winteri* f. *granadensis*, *D. winteri* var. *granadensis*, *Wintera granatensis*

oblasti: J Mexiko, Peru, Střední Amerika

Roste od jižního Mexika po Peru.

Drimys lanceolata (Tasmánský pepřovník)

Drimys winteri (Rozpylec lékařský)

synonyma: *D. aromatica*, *D. polymorpha*, *D. punctata*, *D. winteri* f. *magellanica*, *D. winteri* var. *morenonis*, *D. winteri* var. *punctata*, *D. winteri* var. *semiglobulosa*, *D. winteri* var. *winteri*, *D. winteriana*, *Michelia acris*, *Wintera aromatica*

oblasti: J Čile, JZ Argentina

Roste od jižního Čile po jihozápadní Argentinu. Dorůstá výšky až 15 (i 20)m. Listy má kopinaté, kožovité, lesklé, tmavězelené, dlouhé do 20cm na spodní straně světlejší a namodralé. Kvete bílými až světle smetanovými květy se žlutými středy s mnoha korunními lístky na koncích větví v latách. Plodem je namodralá bobule. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *andina* - zakrslá keříková forma

Odolává teplotám do -20°C.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1348>

<https://www.rostliny.net/>