

Tacca chantrieri (Taka velkokvětá)

čeleď: Taccaceae

oblasti: Bangladéš, Indie, J Čína, Malajsie, Myanmar (Barma), Srí Lanka, Thajsko

Pochází z Indie a jihovýchodní Asie. Pod zemí je oddenek. Dorůstá výšky 20 - 70cm. Pod zemí vytváří tlusté válcovité oddenky. Listy jsou eliptické, špičaté s krátkým hrotem, zeleně pruhované, dlouhé 20 - 60cm, široké (4,4 -) 7 - 22 (i 25)cm, báze klínovitá až zakulacená a řapíky jsou dlouhé 10 - 30cm. Kvete na stvolu s prakticky černými 4mi listeny, vnější 2 jsou vejčitékopinaté, vnitřní široce vejčité, vlastní květy jsou seskupené do 5 - 18tičentého okolíku, mají úzce kopinaté tmavé listence, 6 okvětních lístků ve 2 kruzích, srostlé v trubku a mají 6 tyčinek. Plodem je eliptická hnědá tobolka délky 2 - 4cm, šířky do 3cm a obsahuje mnoho ledvinovitě tvarovaných semen. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *macrantha*

Vyhovují ji vlhké lesy, břehy potoků, atp. ve stínu až polostínu. Půda by měla být stále vlhká, ale ne přemokřená, ideálně navíc propustná a bohatá na živiny. Odolává teplotám do 5°C.

<https://www.rostliny.net/>