Volutaria

čeleď: Asteraceae

Roste od Iberského poloostrova po Blízký východ a Východní Afriku. Nejvíce druhů pochází ze severní Afriky. Nejznámějším druhem je V. lippii.

Volutaria abyssinica

Volutaria belouini

Volutaria bollei

Volutaria boranensis

Volutaria canariensis

Volutaria crupinoides

oblasti: Izrael

Volutaria dhofarica

Volutaria djiboutensis

Volutaria lippii

oblasti: Írán, Izrael, Maroko, S Afrika

Roste od Maroka po Mrtvé moře jako jednoletka. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Lodyha je přímá. Vytváří přízemní růžici z řapíkatých obvejčitých lyrovitých až zpeřených listů, úkrojky jsou podlouhlé a oddáleně zubaté. Lodyžní listy jsou peřenoklané až peřenodílné a krátce řapíkaté. Květenstvím je úbor, zákrov je vejčitý, dlouhý 1 - 1,2cm, zákrovní listeny vyrůstají v několika řadách, jsou střechovitě překryté, ochlupené, přívěsky kopinaté, dlouhé do 3mm, okrajové květy jazykovité, modrofialové a sterilní. Celkově se květenství podobá chrpě. Plodem je nažka délky 3 - 4mm s chmýrem.

Vyhovují mu polopouště, pouště, křoviny, atp.

Volutaria maroccana

Volutaria muricata

oblasti: Andalusie

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 30 - 70cm. Květenstvím je úbor průměru (1,5 -) 1,7 - 2,2cm, délky (0,8 -) 1 - 1,5cm a na zákrovech se vytvářejí ostny délky 3 - 7mm. Plodem je nažka délky 3 - 4mm s chmýrem délky 2,5mm.

Volutaria saharae

Volutaria sinaica

Volutaria somalensis

Volutaria tubiflora

Volutaria tubuliflora

oblasti: Andalusie, Írán, Itálie

Patří mezi jednoletky i trvalky. Listy jsou střídavé, peřenosečné nebo peřenolaločné. Květenstvím je úbor průměru 1,2 - 1,7cm a délky 0,7 - 1,2cm. Plodem je nažka délky 3 - 3,8mm s chmýrem délky 2,5 - 3,5mm.

Další informace:
https://botany.cz/cs/volutaria-lippii/

https://www.rostliny.net/