

Lepidium campestre (Řeřicha chlumní)

synonyma: Crucifera lepidium, Iberis campestris, Lasioptera campestris, Lepia accedens, Lepia campestris, Lepia campicola, Lepia errabunda, Lepidium accedens, L. f. glabratum, L. var. glabratum, Lepidium campicolum, Lepidium denticulatum, Lepidium errabundum, Lepidium vagum, Neolepia campestris, Thlaspi campestre, Thlaspi vulgatius

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Alberta, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází z Evropy. Patří mezi jednoletky nebo dvouletky. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 30 (i 80)cm a je jemně ochlupená. Pod zemí vytváří jednohlavý kořen. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou dlouhé 5 - 13cm, široké 1 - 3cm, lodyžní jsou střídavé, střelovitě tvarované a mají pilový okraj, délku 2 - 6cm a šířku 0,7 - 1,4cm. Kvete v hroznu bílými kvítka, kališní lístky jsou dlouhé 0,8 - 1mm a korunní jsou dlouhé 1 - 2mm. Plodem je šešule délky 5 - 7mm, šířky 3mm a obsahuje 2 hnědá 2,5mm semena. Používá se v léčitelství.

Vyhovují ji násypy, rumiště, skládky, atp.

<https://www.rostliny.net/>