

Lepidium latifolium (Řeřicha širolistá)

synonyma: Cardaria latifolia, Crucifera latifolia, Lepidium dioscorides, L. subsp. affine, L. subsp. sibiricum, L. var. affine, L. var. mongolicum, Lepidium sativum var. latifolium, Lepidium sibiricum, Nasturtiastrum latifolium, Nasturtium latifolium

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Afrika, Alberta, Andalusie, Anglie, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Himálaj, Idaho, Illinois, Indiana, Írán, Itálie, JV Evropa, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kolorado, Malá Asie (Anatolie), Manitoba, Massachusetts, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New York, Nové Mexiko, Oregon, Pákistán, Quebec, Středozemí, Švýcarsko, Texas, Utah, Washington, Wyoming

Roste v Evropě, středozemí a Asie po Himálaj v podobě bohatě větvené trvalky až polokeře. Dorůstá výšky 0,3 - 1,2 (i 2)m. Pod zemí vytváří bohatou síť kořenů. Povrch může být ochlupený. Přízemní listy jsou vejčitě kopinaté, špičaté až zašpičatělé, pilovité, voskovité, dlouhé 5 - 15 (i 25)cm, široké 2 - 7 (i 9,5)cm, s řapíky délky 3 - 10cm, lodyžní jsou střídavé, kopinaté až eliptické, pilovité, přisedlé, dlouhé 5 - 9cm a široké 2,5 - 4cm. Kvete drobnými bílými kvítky zpravidla s narůžovělou bází o průměru 2,5mm na až 5mm stopce v latovitém svislém 25 - 50tikvětém hroznu, kališní lístky jsou úzce vejčité až kulaté, zakulacené, dlouhé 1 - 1,2mm a korunní lístky jsou lžičkovité, zakulacené, dlouhé (1,5 -) 2 (i 2,5)mm a široké 1,5mm. Plodem je šešule délky (1,5 -) 1,8 - 2mm, šířky 1,5mm a obsahuje 2 hnědá načervenalá úzce eliptická semena.

<https://www.rostliny.net/>