

Corallocarpus schimperi

čeleď: Cucurbitaceae

oblasti: Arabský poloostrov, Etiopie, Indie, Írán, Pákistán

Roste v Etiopii, Arabském poloostrově, Íránu, Pákistánu a Indii v podobě popínavky. Stonek je bylinný, občas ochlupený s červenohnědou až šedou borkou. Listy jsou široce vejčitěsrdčité, hustě ochlupené, 3 (i 5)laločné, zubaté, dlouhé 3 - 6 (i 9)cm, široké 3,5 - 9 (i 15)cm, laloky jsou obvejčité a řapíky jsou dlouhé 2 - 4 (i 5)cm. Samčí květy jsou ve vrcholovém 10 - 50tikvětém hroznu o na 1 - 12cm stopce, vlastní květy mají 0,2 - 1,2cm stopku, kalich trubkovitý, dlouhý 1,5mm, laloky 3úhle kopinaté, dlouhé 1 - 1,2mm, korunní lístky žluté se zelenými žilkami, dlouhé 2mm, samičí květenství je 1 - 20tikvěté, přisedlé, vlastní květy mají 1 - 3mm stopku, kalich trubkovitý s 1mm laloky a korunní lístky jsou dlouhé 1,5mm. Plody jsou vejčité až široce eliptické nebo kuželovité, mohou být krátce ochlupené, červené, dlouhé 1 - 1,5 (i 1,7)cm, široké 0,7 - 1cm a obsahují kulovité semeno délky 3mm.

<https://www.rostliny.net/>