

Pseudoscleropodium (Lazovec)

čeleď: Brachytheciaceae

Pseudoscleropodium purum (Lazovec čistý)

synonyma: *P. pseudopurum*, *Scleropodium purum*

oblasti: Afrika, Asie, Atlantský oceán, Azory, Čile, Evropa, Havajské ostrovy, Island, Jamajka, Jižní Amerika, Kanárské ostrovy, Karibik, Madeira, Makaronésie, Nový Zéland, Severní Amerika, Střední Amerika, SZ Afrika, SZ Evropa, Tichý oceán, Velká Británie, Velké Antily, Z Jižní Amerika

Roste ve Velké Británii, Islandu, Azorských ostrovech, Madeiře, Kanárských ostrovech, Jamajce, Havajských ostrovech, Čile, Novém Zélandu, Austrálii, Svaté Heleně, Severní Americe a Asii v poléhavých trsech. Lodyžky jsou dvouřadě větvené, dlouhé 5 - 15cm. Žebro je jednoduché, 2ramenné, dosahuje do 1/2 lístku, vlastní lístky jsou dlouhé 2 - 3mm, vyrůstají ve šroubovici a překrývají se, jsou mírně zvrásněné, špička zakulacená a pilovitá. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. adpressum
- f. australe
- f. bouvetii
- f. condensatum
- f. depauperatum
- f. distichum
- f. elatum
- f. glaucescens
- f. molle
- f. nigrescens
- f. obscurum

-
f. simplex

-
f. turgescens

Vyhovují mu listnaté nebo světlé jehličnaté lesy od nížin po vysokopoložená místa. Půda může být vápnitá, jílovitá nebo písčité se středním obsahem živin.

<http://www.rostliny.net/>