

Eriochloa (Chlupatka)

čeleď: Poaceae

Roste v Africe, Asii, Austrálii, Americe a na několika místech v evropském Rusku.

Eriochloa acuminata

oblasti: Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Jižní Karolína, Kalifornie, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mexiko, Mississippi, Missouri, Nevada, New York, Nové Mexiko, Oklahoma, S Argentina, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Virginie

Roste od USA po Argentinu.

Eriochloa aristata

oblasti: Arizona, Kalifornie, Mexiko, Mississippi

Roste v USA a Mexiku.

Eriochloa australiensis

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii.

Eriochloa boliviensis

oblasti: Bolívie

Roste v Bolívii.

Eriochloa boxiana

oblasti: Karibik, Kolumbie, Mexiko, Venezuela

Roste v Mexiku, střední Americe, Kolumbii a Venezuele.

Eriochloa contracta

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Mexiko, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Tennessee, Texas, Utah, Virginie

Roste v Mexiku, USA a Kanadě. Květenství má délku až 20cm.

Eriochloa crebra

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii.

Eriochloa distachya

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Roste ve střední a Jižní Americe.

Eriochloa fatmensis

oblasti: Arabský poloostrov, Arizona, Indie, Kalifornie, Madagaskar, Mississippi, Sindh, Thajsko

Roste v subsaharské Africe, Madagaskaru a Arabském poloostrově jako jednoletka. Dorůstá výšky 0,1 - 1,2m. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý. Listy jsou dlouhé 3 - 30cm a široké 0,2 - 1cm. Květenství je dlouhé 3 - 20cm, hrozny jsou dlouhé 1 - 5cm, klásky jsou kopinaté a dlouhé (2,5 -) 3 - 5mm.

Eriochloa grandiflora

oblasti: Bolívie, Minas Gerais, Paraguay, SV Argentina

Roste v Bolívii, Paraguayi, Argentině a Brazílii.

Eriochloa lemmonii

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, S Mexiko, Střední Mexiko

Roste v USA a Mexiku.

Eriochloa longiflora

Eriochloa macclounii

oblasti: Botswana, Malawi, Mosambik, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe

Roste v Tanzánii, Malawi, Zambii, Zimbabwe, Mosambiku a Botswaně.

Eriochloa meyeriana

oblasti: Jemen, Madagaskar

Roste v Indickém oceánu, Madagaskaru a Jemenu.

Eriochloa michauxii

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína

Roste v USA.

Eriochloa montevidensis

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Čile, Ekvádor, Paraguay, Uruguay

Roste v Uruguayi, Paraguayi, Brazílii, Bolívii, Čile, Argentině a Ekvádoru.

Eriochloa nana

oblasti: S Argentina, SV Argentina

Roste v Argentině.

Eriochloa nelsonii

oblasti: Mexiko, Střední Amerika

Roste v Mexiku a střední Americe.

Eriochloa pacifica

oblasti: Ekvádor, Galapágy, Peru

Roste v Peru, Ekvádoru a Galapágách.

Eriochloa parvispiculata

oblasti: Keňa, KwaZulu-Natal, Limpopo, Malawi, Mosambik, Mpumalanga, Svazijsko, Tanzánie

Roste v Keni, Tanzánii, Mosambiku, Malawi, Svazijsku a JAR.

Eriochloa peruviana

oblasti: Ekvádor, Peru

Roste v Peru a Ekvádoru.

Eriochloa polystachya

oblasti: Florida, Honduras, Jižní Amerika, Kostarika, Mississippi, Portoriko, Texas

Roste v USA, střední Americe včetně Karibiku a Jižní Americe.

Eriochloa procera (Chlupatka ztepilá)

oblasti: Austrálie, Čína, Indie, Nová Guinea, Sindh, V Afrika

Roste v Austrálii, Nové Guineji, Číně, Indii a východní Africe jako jednoletka. Dorůstá výšky 0,2 - 1m. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý. Listy jsou dlouhé 2 - 30cm a široké 2 - 4mm. Květenství je dlouhé 4 - 20cm, hrozny mají délku 2 - 10cm, klásky jsou kopinaté, ochlupené a dlouhé (2,5 -) 3,4mm.

Eriochloa pseudoacrotricha

oblasti: Austrálie, Texas

Roste v Austrálii.

Eriochloa punctata (Chlupatka tečkovaná)

oblasti: Georgia, Havajské ostrovy, Jižní Amerika, Louisiana, Maryland, Mexiko, Mississippi, Portoriko, Texas

Roste v USA, Mexiku, střední Americe a Jižní Americe.

Eriochloa rovimensis

oblasti: Mosambik, Tanzánie

Roste v Tanzánii a Mosambiku.

Eriochloa sericea

oblasti: Coahuila, Kansas, Oklahoma, Tamaulipas, Texas

Roste v USA a Mexiku.

Eriochloa setosa

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Eriochloa stapfiana

oblasti: Keňa, KwaZulu-Natal, Limpopo, Madagaskar, Mosambik, Mpumalanga, Svazijsko, Tanzánie

Roste na Madagaskaru, Keni, Tanzánii, Mosambiku, Svazijsku a JAR.

Eriochloa stevensii

oblasti: Ekvádor, Kostarika, Nikaragua, Peru, Venezuela

Roste v Kostarice, Nikaragui, Ekvádoru, Venezuele a Peru.

Eriochloa subulifera

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Eriochloa succincta

oblasti: Irák, Írán, JZ Rusko, Kavkaz, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Roste na jihozápadě Ruska, Kavkaze, Íránu, Iráku, Kazachstánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu a Tádžikistánu.

Eriochloa tridentata

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie

Roste v Brazílii, Bolívii a Argentině.

Eriochloa villosa (Chlupatka srstnatá)

oblasti: Florida, Illinois, Iowa, J Japonsko, JV Rusko, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Korea, Minnesota, Mississippi, Missouri, Pennsylvania, Tchaj-wan, Vietnam, Virginie, Wisconsin

Roste v Rusku, Číně, Koreji, Vietnamu a Japonsku.

Eriochloa weberbaueri

oblasti: Ekvádor, Peru

Roste v Peru a Ekvádoru.

<https://www.rostliny.net/>