

Leysera

čeleď: Asteraceae

Nejznámějším druhem je *L. gnaphalodes*.

Leysera gnaphalodes

oblasti: Kapsko, Namibie

Roste v JAR a Namibii v podobě od báze větveného keře. Dorůstá výšky (0,05 -) 0,1 - 0,5 (i 1)m. Větvě jsou prutovité, v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, přisedlé, čárkovité s hrotem, šedozelené a žláznatě ochlupené. Květenstvím je samostatný žlutý úbor o průměru 2cm, zákrov je zvonkovitý, 4 - 5tiřadý, listeny podlouhlé, světlehnědé s tmavým okrajem, žláznaté, jazykovité květy samičí, v terči oboupohlavné.

Vyhovují mu hlubší dobře propustné půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Leysera leyseroides

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Balúčistán, Egypt, Irák, Írán, Izrael, Libye, Maroko, Palestina, Saudská Arábie, Sinajský poloostrov, Súdán, Tunisko

Roste od Maroka po Pákistán jako jednoletka. Dorůstá výšky 7 - 30cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou střídavé, ochlupené, dlouhé 0,5 - 2,5cm a široké 0,5 - 1 (i 1,5)mm. Květenstvím je úbor délky 0,7 - 1cm a šířky 2,5 - 5mm na 1,5 - 4,5cm stopce, zákrovních lístků je 15 - 45, jsou špičaté až zašpičatělé, vnější menší, vejčité, vnitřní podlouhlé až čárkovité, dlouhé 6 - 9mm, široké 0,6 - 1,5mm, okvětních lístků je 8 - 30, jsou velmi malé, terčových květů je 20 - 100 s délkou 2,8 - 4mm. Plodem je nažka délky 3 - 4mm s chmýrem délky 0,3 - 0,5mm.

Leysera tenella

Další informace:

<http://skalnický.kadel.cz/t/kvResult.asp-Rod=Leysera.htm>

<https://botany.cz/cs/leysera-gnaphalodes/>

<https://www.rostliny.net/>