

Noaea

čeleď: Chenopodiaceae

Roste v podobě trnitého polokeře, keře nebo jednoletky. Listy jsou střídavé, úzké až nitkovité. Kvete oboupohlavnými samostatnými květy v úžlabí, obal je úzký, 5ticípý, za plodu na hřbetě křídlaé a mají 5 tyčinek.

Noaea leptoclada

oblasti: Kavkaz, Malá Asie (Anatolie)

Roste na Kavkaze a Turecku v podobě keře nebo polokeře. Dorůstá výšky 40 - 75cm. Povrch je nasivělý. Větve vyrůstají v ostrém úhlu. Listy jsou nitkovité, špičaté, dlouhé 1 - 3cm a široké 1mm. Listeny mají délku květů, listence jsou kopinaté až vejčité, špičaté, kýlnaté, na bázi s hrbolek, mírně delší květů, vlastní květy vyrůstají samostatní, cípy obalu blanité, drobně hrotilé s křídlovitými výrůstky v době plodu.

Noaea major

oblasti: Afganistán, Balúčistán

Roste v Afganistánu a Pákistánu jako vzpřímená až rozkladitá jednoletka. Dorůstá výšky do 40cm. Stonek může být větvený. Listy jsou dlouhé do 1,5cm a široké 0,5mm. Plody mají asymetrická křídla délky 3mm, šířky 2mm, semena jsou dlouhá 1,5mm a široká 0,8mm.

Noaea mucronata

oblasti: Arménie, Egypt, Írán, Izrael, Kréta, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Palestina, Řecko

Roste v Řecku, Turecku, Krétě, Arménii, Kurdistánu, střední Asii, Egyptě a Maroku v podobě trnitého bohatě větveného keře. Dorůstá výšky (20 -) 25 - 50 (i 75)cm. Větve jsou v mládí nasivělé (i zelené), u báze bělavé, vodorovné až obloukovité a trnité. Listy vyrůstají střídavě, spodní jsou nitkovité, na řezu kulaté, opadavé, dlouhé 3 - 5cm a ostatní jsou kratší. Listeny i listence jsou zpravidla trochu delší než květy, listene jsou vejčité, člunkovité, kýlnaté, vlastní květy jsou samostatné, obal má délku 4mm s tuhými mírně hrotilými cípy, za plodu křídlaté s obvejčitými asymetricky zubatými blanitými nažloutlými později skvrnitými křídly o velikosti 3 - 6mm. Semena jsou eliptická a dlouhá 2mm.

Noaea tournefortii

oblasti: Írán

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2572>

<https://www.rostliny.net/>