

Poa alpina (Lipnice alpská)

synonyma: *P. f. vivipara*, *P. subsp. atlantica*, *P. subsp. balcanica*, *P. subsp. bivonae*, *P. subsp. brevifolia*, *P. subsp. digitata*, *P. subsp. fallax*, *P. subsp. insularis*, *P. subsp. stefanovii*, *P. subsp. vivipara*, *P. var. atlantica*, *P. var. brevifolia*, *P. var. buxicola*, *P. var. frigida*, *P. var. intermedia*, *P. var. macedonica*, *P. var. minor*, *P. var. obtusata*, *P. var. parva*, *P. var. subalpina*, *P. var. vivipara*, *Poa badensis* subsp. *insularis*, *Poa bivonae*, *Poa blepharachne*, *Poa borisii*, *Poa djurdjurae*, *Poa elbrussica*, *Poa flavescens*, *Poa frigida*, *Poa insularis*, *Poa macedonica*, *Poa macedonica* var. *achterovii*, *Poa macedonica* var. *nana*, *Poa macedonica* var. *pseudovivipara*, *Poa macedonica* var. *tenuifolia*, *Poa olympica*, *Poa pratensis* var. *alpina*, *Poa stolonifera*, *Poa violascens*, *Poa vivipara*, *Uralepis mutica*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Alpy, Asie, Atlantský oceán, Britská Kolumbie, Česká republika, Evropa, Grónsko, Hrubý Jeseník, Iberský poloostrov, Idaho, Írán, Itálie, J Evropa, J Kanada, J USA, JZ Asie, JZ Evropa, Kanada, Karpaty, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Manitoba, Michigan, Montana, Morava, Německo, Nevada, Newfoundland, Newfoundland a Labrador, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Oregon, Polsko, Quebec, S Evropa, S Kanada, S Morava, S Severní Amerika, S USA, Saskatchewan, Severní Amerika, Severozápadní Teritorium, Střední Asie, Střední Evropa, Střední Kanada, Střední Severní Amerika, Střední USA, SV Španělsko, SV USA, SZ Severní Amerika, SZ USA, Španělsko, Švýcarsko, Ťan-šan, Ukrajina, USA, Utah, V Evropa, V Kanada, V Karpaty, Washington, Wyoming, Yukon, Z Kanada, Z USA

Roste v trsech. Dorůstá výšky 3 - 50cm. Přízemní listy jsou ploché, zpravidla žlábkované, zelené, měkké, slabé, dlouhé 4 - 12cm, jazýček nejvyššího stébelného listu je špičatý a dlouhý do 5mm, u dolních listů uťatý a dlouhý 1 - 2mm. Květenstvím je vejčitá lata délky 3 - 9cm, šířky 2 - 4cm, klásky jsou zelené s nafialovělými nebo nažloutlými skvrnami, bývají živorodé (ale ne v ČR), na bázi s nepatrnou až žádnou huninkou a čepel nejvyššího stébelného listu je kratší nebo stejně dlouhá jako pochva. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *alpina*
- subsp. *arnautica*
- subsp. *brevifolia*
- var. *jemtlandica*

Roste nad hranicí lesa, vyhovují ji skalní štěrbin, kamenité svahy a nivy.

<http://www.rostliny.net/>