

Poa pratensis (Lipnice luční)

synonyma: *Panicum pratense*, *Poa agassizensis*, *Poa alpigena* subsp. *sobolevskiana*, *Poa anceps*, *Poa anceps* var. *breviculmis*, *Poa angustifolia* subsp. *anceps*, *Poa angustifolia* subsp. *costata*, *Poa angustifolia* var. *anceps*, *Poa angustifolia* var. *angustiglumis*, *Poa angustifolia* var. *pratensis*, *Poa angustiglumis*, *Poa athroostachya* var. *anceps*, *Poa bidentata*, *Poa boliviensis*, *Poa bourgeaei*, *Poa brintnellii*, *Poa compressoformis*, *Poa costata*, *Poa dolichachyra*, *Poa dolichachyra* var. *longiflora*, *Poa florida*, *Poa garanica*, *Poa gelida*, *Poa ianthoides*, *Poa luzoniensis*, *Poa magensiana*, *Poa maydellii*, *Poa montana*, *Poa nymannii*, *Poa oligeria*, *Poa pachyantha*, *Poa paratunkensis*, *Poa peckii*, *Poa pinegensis*, *P. f. latifolia*, *P. subsp. agassizensis*, *P. subsp. anceps*, *P. subsp. angustiglumis*, *P. subsp. rigens*, *P. subsp. sabulosa*, *P. subsp. sergievskajae*, *P. subsp. skrjabinii*, *P. subsp. sobolevskiana*, *P. subsp. turfosa*, *P. subsp. zhukoviae*, *P. var. anceps*, *P. var. angustiglumis*, *P. var. arenaria*, *P. var. arida*, *P. var. atlantica*, *P. var. attica*, *P. var. costata*, *P. var. domestica*, *P. var. filifolia*, *P. var. latifolia*, *P. var. lax*, *P. var. macounii*, *P. var. mayd*, *P. var. muralis*, *P. var. paratunkensis*, *P. var. pinegensis*, *P. var. planiculmis*, *P. var. retroflexa*, *P. var. rigens*, *P. var. sabulosa*, *P. var. stricta*, *P. var. subglabriflora*, *P. var. transnominata*, *P. var. turfosa*, *P. var. umbrosa*, *P. var. urjancaica*, *Poa pseudopratensis*, *Poa rigens*, *Poa sergievskajae*, *Poa sobolevskiana*, *Poa stenachyra*, *Poa subcaerulea* var. *anceps*, *Poa subglabriflora*, *Poa todarii*, *Poa turfosa*, *Poa urjancaica*, *Poa viridis*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Dánsko, Delaware, Estonsko, Finsko, Florida, Francie, Georgia, Grónsko, Gruzie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Krym, Kypr, Labrador, Libanon, Litva, Louisiana, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardinie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Špicberky, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Turecko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Z Rusko, Západní Virginie

Roste v Evropě, Asii, severní Africe a Severní Americe. Patří mezi trvalky. Roste v řidších trsech. Pod zemí vytváří oddenek. Dorůstá výšky 0,30 - 0,9 (i 1,2)m. Stébla mívají 2 - 4 kolénka a bázi zpravidla s větším počtem odumřelých listových pochev. Listy jsou úzké, čárkovité, zelené až žlutozelené, neojíněné, ploché (občas některé svinuté), dlouhé do 20cm, široké 3 - 5mm a jazýček je holý. Květenství tvoří zelené občas nafialovělé klásky v latě, plevy vejčité až eliptické, zašpičatělé a nestejně. Plodem je obilka délky 1,5 - 1,8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *angustifolia*
- var. *hatusimae*
- subsp. *latifolia*
- var. *maydellii*
- subsp. *pratensis* (Lipnice luční pravá) - teplé oblasti
- subsp. *colpodea* - chladné oblasti

Vyhovují jí louky, pastviny, rumiště, okraje cest, řídké listnaté lesy a vlhčí půdy.

<https://www.rostliny.net/>