

# Benincasa (Tykev)

čeleď: Cucurbitaceae

Existuje pouze jediný druh.

## Benincasa hispida (Tykev vosková)

synonyma: *B. cerifera*

oblasti: Čína, Havajské ostrovy, Indie, Japonsko, Malajsie, Malé Sundry, Pákistán, V Austrálie, Velké Sundry

Roste v tropech a subtropích, především v jihovýchodní Asii a pochází zřejmě ze Sundských ostrovů. Patří mezi jednoletky a jednodomé bylinné rostliny. Roste na plazivých čtyřhranných žebnatých lodyhách jako silná liána. Na povrchu má husté drsné chloupky. Dorůstá takto délky až několika metrů. Opory se přichytává díky úponkům. Listy mají dlanitokálný tvar s 5 - 7mi vejčité3úhlými laloky, pilovým okrajem, délku 10 - 25cm, šířku 10 - 20cm, řapík má délku 10 - 25cm a je chlupatý. Kvete v paždí listů zvoncovými jednopohlavnými květy se stříbřitě chlupatým kalichem délky 1 - 1,5cm, špičatými kopinatými laloky délky 0,6 - 1,2cm s 5ti korunními lístky délky 3 - 5cm, šířky 2 - 4cm, v průměru dosahuje 8 - 12cm a samčí jsou na dlouhé stopce, dlouhé 5 - 15cm, samičí má délku 2 - 4cm. Plodem je válcovitá bobule délky 0,2 - 0,6 (i 2)m, průměru 10 - 25 (i 30)cm, hmotnosti 2 - 8 (i 30)kg, barva je zelená až šedozelená, nicméně je pokrytá modrobílou voskovou vrstvou a pichlavými chloupky, dužina má tloušťku pouze 2 - 4cm, má bělavou průsvitnou barvu a nemá výraznou chuť. Obsahuje mnoho semen žlutohnědé barvy délky 1cm a šířky 6mm.

Potřebuje teplo, bohatou závlivku a půdu bohatou na živiny.

Množí se semeny, které je dobré nejdříve na cca 4hod namočit do teplé vody, dále ve velhku nechat naklíčit a až poté přesunout do zeminy.

<https://www.rostliny.net/>