

Holosteum umbellatum (Plevel okoličnatý)

čeleď: Caryophyllaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Palestina, Pennsylvania, Polsko, Rhode Island, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste jako jednoletka. Dorůstá výšky (3 -) 5 - 20 (i 40)cm. Stonků bývá více, jsou vzpřímené, nevětvené, sivozelené a žláznatě ochlupené. Vytváří přízemní růžici z obkopinatých až lžičkovitých listů, ostatní jsou přisedlé, tupě vejčité, dlouhé 1 - 2cm, široké 2 - 5mm a sbíhavé. Kvete ve zdánlivém okolíku bílými nebo jemně narůžovělými květy po 5 - 15 (i 19)ks s 5ti korunními jemně zoubkatými lístky a eliptickými kališními lístky délky (3 -) 4 (i 5)mm, korunní lístky jsou bílé a stejné délky. Plodem je tobolka délky 5 - 7mm a obsahuje červenohnědá semena. Celý její vývoj je rychlý. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. glaberrimum/var. glaberrimum
- subsp. glutinosum/Arenaria glutinosa/H. glutinosum/H. heuffelii/H. liniflorum/var. glutinosum - výška 8 - 15cm; listy podlouhlé, dlouhé 1,5cm, široké 2mm; květy mají kališní lístky délky 4mm, korunní lístky delší kalicha, bílé a eliptické; tobolka délky 0,8 - 1cm
- subsp. hirsutum/var. hirsutum
- subsp. umbellatum
- subsp. viscosissimum/var. viscosissimum

Vyhovují mu okraje cest v hlinitopísčitých a vápnitých půdách.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>