

# Seidlitzia

čeleď: Chenopodiaceae

Listy jsou vstřícné. Roste v podobě jednoletky nebo keře. Květy jsou oboupohlavné, opatřené listenci, vyrůstají samostatně nebo po několika ks v patřích listů, obal má 5 blanitých cípů, křídla jsou půlkulatá nebo široce vejčitá, na bázi spojená. Plody jsou vodorovné.

## Seidlitzia florida

oblasti: Írán, Palestina

Roste jako jednoletka. Dorůstá výšky 10 - 50cm. Větví se od bázi a větve jsou vstřícné. Květenství je 1 - 3četné. Plody mají v průměru 1,5 - 2mm.

## Seidlitzia oppositifolia

oblasti: Palestina

Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 0,2 - 1,5 (i 2)m. Stonky jsou vystoupavé až vzpřímené. Listy jsou vstřícné, dlouhé 1 - 2,5cm a široké 2mm. Kvete bělavými květy. Plody mají v průměru 0,8 - 1,2cm.

## Seidlitzia rosmarinus

oblasti: Arabský poloostrov, Írán, Izrael, Palestina, Střední Asie

Roste od střední Asie po Arabský poloostrov v podobě široce větveného keře. Dorůstá výšky do 1,5 (i 2)m. Kmínky mají průměr do 4cm. Borůvka je našedlá a podélně rýhovaná. Větve jsou lesklé a bílé. Listy jsou ztlustlé, mírně kyjovité, tupé, dlouhé 0,5 - 3cm a na bázi rozšířené. Květenství je 2 - 3 (i 5)tičetné, květní obal tvoří eliptické cípy, zpravidla vykrojené, za plodu křídlaté, křídla jsou bezbarvá, narůžovělá, později až hnědošedá a 1/2 průsvitná. Plody mají v průměru 2 - 2,5mm a barvu hnědou s bělavým lemem.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=4566>

<https://www.rostliny.net/>