

Scrophularia umbrosa (Krtičník křídlatý)

synonyma: *Scrophularia alata*, *Scrophularia aquatica*, *Scrophularia samaritani*

čeleď: Scrophulariaceae

oblasti: Írán, Irsko, Itálie, Kyrgyzstán, Německo, New Jersey, Pennsylvania, Polsko, Švýcarsko

Roste na severní polokouli jako trvalka. Dorůstá výšky 0,4 - 1 (i 1,3)m. Povrch je v době květu mírně žláznatý. Lodyha je křídlatá (1/3 šířky min. lodyhy). Vstřícné listy mají vejčitý tvar délky až 16cm a šířky až 8cm s jemně vroubkovaným okrajem. Řapíky listů jsou křídlaté. Kvete hnědočervenými pyskatými květy ve vrcholičnaté latě, okraje kališních cípů jsou skořicově hnědé. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *umbrosa*/*S. alata* subsp. *umbrosa* (Krtičník křídlatý pravý) - lodyha má křídla 1/3 - 1/2 šířky lodyhy; přízemní listy jsou špičaté, na okraji mohou být ostře pilovité; korunní lístky hnědozelené, nazelenalé až žlutozelené, na hřbetu tmavě hnědočervené; vyskytuje se v nížinách a pahorkatinách
- subsp. *neesii*/*S. alata* subsp. *neesii* (Krtičník křídlatý Neesův) - vzácnější; lodyha má křídla min. stejně široké jako je lodyha; přízemní listy jsou tupé (až zakulacené), okraje vroubkované; koruna je hnědočervená, u báze nazelenalá

Vyhovuje mu polostín a vlhko u vodních toků, rákosiny, bahnitě půdy, atp.

<https://www.rostliny.net/>