

Galinsoga parviflora (Pěťour malokvětý)

synonyma: *Adventina parviflora*, *Galinsoga hirsuta*, *Galinsoga laciniata*, *G. f. parceglandulosa*, *G. f. subeglandulosa*, *G. subsp. parceglandulosa*, *G. var. adenophora*, *Galinsoga quinquerradiata*, *Galinsoga semicalva*, *Stemmatella sodiroi*, *Vigolina acmella*, *Wiborgia acmella*, *Wiborgia parviflora*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Jižní Americe jako jednoletka. Dorůstá výšky do (10 -) 20 - 60 (i 80)cm. Lodyha je holá nebo řídce přitiskle ochlupená. Vstřícné listy jsou v horní části přisedlé, mají dlouze vejčitý tvar se špičkou, drobně pilový okraj (zuby kratší než 2mm). Kvete v úboru o průměru 4 - 7mm, terč je žlutý, okvětní lístky bílé délky menší než 1/2 průměru terče. Plodem je nažka délky 1,3 - 1,5mm s chmýrem 1 - 1,7mm.

Vyhovují mu vlhčí hlinité nebo písčité půdy bohaté na dusík.

<https://www.rostliny.net/>