

Corrigiola litoralis (Drobnokvět pobřežní)

čeleď: Caryophyllaceae

oblasti: Atlantský oceán, Austrálie, Britská Kolumbie, Česká republika, Dánsko, Itálie, Izrael, Jordánsko, JZ Evropa, Libanon, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Oregon, Pennsylvania, Polsko, S Afrika, Středozemí, Sýrie, Švýcarsko, Turecko, Z Evropa

Roste v západní a jihozápadní Evropě, Africe a zavlečená byla do Austrálie a Severní Ameriky. Patří mezi jednoletky. Lodyha je poléhavá, dlouhá 7 - 20 (i 30)cm, zpravidla větvená, hladká a vyrůstá z kruhovitých trsů. Listy jsou přisedlé, mají kopinaté asymetricky zubaté palisty, lodyžní listy jsou střídavé, čárkovité až úzce kopinaté, dlouhé 0,5 - 2cm (v přízemní růžici až 3cm). Květenstvím je hustý klubkovitě stažený vidlan, vlastní květy mají v průměru 1,5 - 2cm, kališní lístky jsou tupé, dlouhé 1 - 1,5mm, korunní lístky jsou vejčité až prakticky kulaté, bílé a mají 5 tyčinek. Plodem je široce eliptická mírně 3boká nažka délky 1 - 1,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. imbricata
- subsp. perez-larae
- subsp. telephiifolia

Vyhovují mu vlhké písčiny, štěrkové náplavy nebo i suché železniční náspy.

<https://www.rostliny.net/>