

Gerrardanthus (Kulovec)

čeleď: Cucurbitaceae

Rodové jméno pochází z kombinace jméno britského přírodovědce a cestovatele W. T. Gerrarda a řeckého slova anthos = květ. Patří mezi vytrvalé popínavé rostliny s 2klanými úponkami. Dorůstá délky několika m a sukulentní kaulifolní báze do šířky až 1,5m. Stonek je bylinný, ale postupně dřevnatí a nabírá šedohnědou barvu. Květy jsou dvoudomé a mají 5 tyčinek. Plodem je převislá tobolka obsahující semena s blanitými křídly.

Gerrardanthus grandiflorus

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě popínavé rostliny. Dorůstá délky až 10m. Listy jsou široce vejčité, zašpičatělé, dlouhé 6 - 12cm, široké 5 - 1cm a na bázi srdčité. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou oranžové, korunní lístky nestejně a dlouhé 0,9 - 1,5cm. Plody jsou dlouhé 6 - 8cm a široké 3 - 5cm.

Gerrardanthus lobatus

oblasti: Nigérie, Tanzánie, Uganda

Pochází z Nigérie, Ugandy a Tanzánie. Roste v podobě popínavé rostliny. Dorůstá délky do 6m. Listy mohou mít 3 - 5 laloků, špičku, délku 3 - 14cm, šířku 4 - 12cm a srdčitou bázi. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou oranžové, korunní lístky nestejně a dlouhé 0,9 - 1,5cm. Plody jsou dlouhé 6 - 8cm a široké 3 - 5cm.

Gerrardanthus macrorhizus

oblasti: Západní Kapsko

Pochází z jižní Afriky. Na bázi vytváří mohutný kaudex uchovávající zásoby živin a který může údajně dorůst průměru až 1,5m a výšky 60cm. Listy jsou tmavězelené, laločnaté, tvarově podobné břečťanu. Kvete drobnými hnědozelenými květy. Plody jsou zploštělé, dlouhé 6cm a široké 2cm.

Vyhovuje ji polostín až světlý stín. V době vegetace vyžaduje větší množství vody. Přes zimu stonek a listy usychají. Odstřihnou se a zcela se zastaví zálivka až do jara, kdy začne znovu vytvářet stonek.

Množí se řízků, které snadno pouštějí kořeny ve vodě.

Gerrardanthus paniculatus

Gerrardanthus tomentosus

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z JAR. Výhony dorůstají délky až 15m.

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1927>

<https://www.rostliny.net/>