

Searsia pyroides

čeleď: Anacardiaceae

oblasti: Botswana, Jihoafrická Republika (JAR), Namibie, Tanzánie, Zimbabwe

Roste v JAR, Botswaně, Namibii, Tanzánii a Zimbabwe v podobě opadavého keře až stromu. Dorůstá výšky 1 - 6m. Borka je hladká, šedá. Větve jsou v mládí mírně převislé. Listy jsou 3četné, tmavězelené, lesklé, občas mají dřevité trny, vlastní lístky jsou eliptické až obvejčité, sivozelené, ochlupené, střední má délku 0,6 - 8,5cm, šířku 0,5 - 2,9cm, postranní jsou mírně menší, spodní strana je světlejší, báze zúžená, centrální žilka oboustranně vyniklá, jsou přisedlé, ale řapíky jsou dlouhé až 5cm. Kvete drobnými nazelenalými převislými květy v úžlabních nebo vrcholových latech. Plodem je žlutá až červená kulovitá lesklá peckovice průměru 3 - 4 (i 5)mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *dinteri*/*Rhus dinteri* - Namibie; lístky na vrcholu zakulacené, ale s hrotem
- var. *gracilis* - keř nebo strom, zpravidla rozkladitý; listy hustější, tmavší, lístky oboustranně hedvábité
- var. *integrifolia*/*Rhus fraseri*/*Rhus intermedia*/*Rhus microcarpa* - větve protáhlé; listy husté, dlouhé 1,6 - 12,5cm, široké 0,7 - 4,8cm, lístky na spodní straně s hustě ochlupenou žilnatinou; plody menší

Vyhovují ji skalnaté svahy.

<https://www.rostliny.net/>