

Ampelocissus

čeleď: Vitaceae

Roste v tropech Afriky, Asie, střední Ameriky a v tichomoří. Stonek je bylinný nebo dřevnatý a popínavý díky nevětveným nebo i 2klanným úponkům. Palisty jsou drobné. Listy jsou střídavé, jednoduché, zpravidla mělce laločnaté nebo i 3 - 5tičetné. Květenstvím je kulovitý chocholičnatý vrcholík nebo kuželovitá zpravidla 5tičetná lata, oboupohlavná nebo mnohomanželně dvoudomá, vlastní květy mají pohárkovitý zpravidla 5tilaločný kalich. Plody jsou kulovité nebo eliptické bobule obsahující 1 - 4 obvejčitá, kulovitá nebo eliptická semena.

Ampelocissus abyssinica

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Ampelocissus acapulcensis

oblasti: Guatemala, J Mexiko, Salvador

Roste v Mexiku, Guatemale a Salvadoru v podobě dřevité popínavé rostliny. Listy jsou vejčité srdčité, špičaté, zubaté (i mělce 3laločné), v mládí plstnaté, dlouhé 6 - 16cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 5cm. Květenstvím je lata šířky až 25cm, vlastní květy jsou tmavěčervené, stopky ochlupené a korunní lístky jsou špičaté. Plody jsou růžovofialové, kulovité a průměru 1,5 - 2,5cm.

Ampelocissus acetosa

oblasti: Queensland, Severní teritorium, Západní Austrálie

Roste v Austrálii.

Ampelocissus aculeata

Ampelocissus africana

oblasti: Botswana, Burundi, Čad, Guinea, Kamerun, Keňa, Malawi, Mosambik, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Rwanda, Středoafriická Republika, Súdán, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe

Roste v tropické Africe v podobě popínavého keře nebo liány o délce 0,5 - 9m. Úponky jsou větvené. Listy jsou vejčité až prakticky kulaté, špičaté, jednoduché až 3 - 5tilaločné, pilovité až vroubkované, mohou být ochlupené, dlouhé 5 - 20cm, široké 5 - 25cm, báze srdčitá a řapíky jsou dlouhé 3 - 13cm. Květenství je dlouhé 5 - 10cm, vlastní květy mají 1 - 2mm stopku, kalich velikosti 1,5mm, korunní lístky dlouze vejčité, zelené, nažloutlé až načervenalé a velikosti 1,5mm. Plode jsou červené až růžovofialovočerné, prakticky kulaté, průměru 1cm a obsahují hnědá semena.

Ampelocissus amentacea

Ampelocissus angolensis

Ampelocissus arachnoidea

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

Ampelocissus araneosa

Ampelocissus artemisiifolia

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě dřevité liány. Větve jsou podélně rýhované a ochlupené. Úponky jsou 2ramenné. Listy jsou 3četné, mají 2,5 - 4cm řapíky, vlastní lístky mají centrální lístek eliptický až kosočtvercovitý, špičatý, na okraji s 5 - 14ti zuby, je dlouhý 3 - 6cm, široký 2 - 3cm, báze asymetrická, řapíčky jsou dlouhé 5mm, postranní lístky jsou eliptické, špičaté nebo tupé, řídce ochlupené, na okraji s 5 - 11ti zakulacenými zuby, jsou dlouhé 2 - 5,5cm, báze zpravidla asymetrická, spodní strana pavučinovitá a žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek. Květenství vyrůstá proti listům, má 6 - 7cm stopku, vlastní květy mají 1 - 2mm stopku, poupata kulovitá velikosti 1,5 - 2mm, kalich je holý, korunní lístky jsou podlouhlé a dlouhé 1,4 - 1,8mm. Plodem je kulovitá bobule velikosti 7 - 8mm obsahující 2 - 3 podlouhlá semena.

Ampelocissus ascendiflora

oblasti: Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově a v Singapuru jako popínavá rostlina. Stonek má průměr do 3mm, v mládí bývá ochlupený a později hnědne. Listy jsou v mládí ochlupené, jsou eliptické, dlouhé 4,5 - 18cm, široké 5,5 - 14cm, spodní strana postupně hnědne a řapíky jsou dlouhé 4,5 - 16cm. Květenstvím je hrozen nebo klas délky 13 - 21cm. Plody mají v průměru 8mm a obsahují semena délky 7mm a šířky 6mm.

Ampelocissus asekii

oblasti: Papua-Nová Guinea

Roste na Papui-Nové Guineji.

Ampelocissus banaensis

Ampelocissus barbata

oblasti: Bhútán, Západní Bengálsko

Roste v Bhútánu a Indii. Kmínky jsou žláznatě štětinaté, stejně tak úponky. Listy jsou jednoduché nebo mělce 3 - 5tilaločné, vejčité, špičaté, asymetricky mělce zubaté, dlouhé 15 - 27cm, široké 12 - 22cm, báze hluboce srdčitá, žilnatinu tvoří 7 žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 16cm. Květenstvím je lata průměru 0,9 - 1,2cm, vlastní květy jsou bělavé nebo žlutozelené, kalich pohárkovitý, mělce laločnatý a korunní lístky jsou dlouhé 1,5 - 2mm. Plodem je černá kulovitá bobule průměru 1cm.

Ampelocissus birii

Ampelocissus bombycina

Ampelocissus borneensis

Ampelocissus botryostachys

Ampelocissus butoensis

oblasti: Sichuan

Roste v Číně v podobě dřevité liány. Větve jsou podélně rýhované a řídce ochlupené. Úponky jsou 2ramenné. Listy jsou 3četné, řapíky dlouhé 1,5 - 6cm, středové lístky jsou eliptické až vejčité, špičaté, zpravidla zpeřeně rozeklané s 5 - 10ti tupými zuby, dlouhé 3 - 8cm, široké 2 - 6,5cm, báze klínovitá, řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2,5cm, postranní lístky jsou eliptické, špičaté, zpravidla zpeřeně rozeklané, v mládí ochlupené, na okraji s 5 - 7mi tupými zuby, dlouhé 2 - 6,5cm, široké 1,5 - 5,5cm, báze asymetrická, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek a řapíčky jsou dlouhé 0,3 - 1,5cm. Květenství vyrůstá proti listům na 4 - 4,5cm stopce, plodem je mírně obvejčitá bobule délky 0,7 - 1cm, šířky 6 - 8mm a obsahuje 2 - 3 podlouhlá semena.

Ampelocissus capillaris

Ampelocissus cardiospermoides

Ampelocissus celebica

Ampelocissus chaffanjonii

Ampelocissus changensis

Ampelocissus cinnamomea

Ampelocissus complanata

Ampelocissus compositifolia

Ampelocissus concinna

oblasti: Angola

Pochází z Angoly.

Ampelocissus costaricensis

Ampelocissus debilis

Ampelocissus dekindtiana

Ampelocissus dichothrix

Ampelocissus dissecta

Ampelocissus divaricata

oblasti: Bhútán

Roste v Bhútánu. Kmínky jsou načervenalé a v mládí ochlupené. Listy jsou 3četné, občas jednoduché a laločnaté, řapíky jsou dlouhé 3 - 12cm, centrální lístek je kopinatý až vejčitý, špičatý, pilovitý, mělce laločnatý, dlouhý 9 - 25cm, široký 3,5 - 12cm, báze zakulacená, spodní strana plstnatá a postranní lístky jsou na bázi asymetrické. Květenstvím je načervenalý kulovitý vrcholík průměru 5 - 8cm, vlastní květy mají krátce laločnatý kalich, korunní lístky červené a velikosti 1mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 1cm.

Ampelocissus dolichobotrys

Ampelocissus edulis

Ampelocissus elegans

Ampelocissus elephantina

Ampelocissus erdvendbergiana

Ampelocissus erdwendbergii

oblasti: Guatemala, J Mexiko

Roste v Guatemale a Mexiku v podobě dřevité popínavky. Kmínky bývají v mládí plstnaté. Listy jsou vejčitě srdčité, špičaté, občas mělce laločnaté, asymetricky zubaté, zelené, min. v mládí drobně ochlupené, široké 6 - 15cm, spodní strana plstnatá a řapíky jsou dlouhé do 6,5cm. Květenství může být velké i malé, husté i řídké a vlastní květy mají stopku délky 2 - 3mm. Plodem je prakticky kulatá boule velikosti 0,5 - 1cm obsahující obsrdčitá semena délky 5mm.

Ampelocissus filipes

Ampelocissus floccosa

Ampelocissus frutescens

oblasti: Severní teritorium

Roste v Austrálii.

Ampelocissus gardineri

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

Ampelocissus gracilipes

oblasti: Ghana, Libérie

Roste od Ghany po Libérii. Stonek je polodřevitý, ochlupený a tvrdý.

Ampelocissus gracilis

Ampelocissus harmandii

Ampelocissus helferi

Ampelocissus hoabinhensis

oblasti: Nepál, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Nepálu a Vietnamu v podobě dřevité liány. Větve jsou ochlupené a podélně rýhované. Úponky jsou 3ramenné. Palisty jsou opadavé. Listy jsou jednoduché, ochlupené, vejčité, ostře zubaté, špičaté nebo hrotité, dlouhé 18 - 23cm, široké 15 - 18cm, báze srdčitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 7 bazálních žilek a 4 - 6 párů postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 10 - 13cm. Květenstvím je řídká plstnatá lata, vlastní květy mají 1,8 - 2mm stopku, poupata mírně vejčitá, dlouhá 2mm, zakulacená nebo tupá, korunní lístky jsou eliptické a dlouhé 2mm.

Ampelocissus humulifolia

Ampelocissus imperialis

Ampelocissus indica

Ampelocissus iomalla

Ampelocissus javalensis

Ampelocissus korthalsii

Ampelocissus latifolia

oblasti: Ásám, Bangladéš, Bengálsko, Bihár, Džammú a Kašmír, Írán, Nepál, Pákistán, SZ Indie

Roste v Bangladéši, Indii, Nepálu a Pakistánu. Listy jsou špičaté, zubaté, 3 - 7milaločnaté (laloky špičaté), dlouhé 7 - 15cm, široké 8 - 15cm a řapíky jsou dlouhé 3 - 5cm. Květenství tvoří tmavěčervené květy, kalich je 5tízubý a mají 5 korunní lístků. Plodem je černá bobule velikosti 6 - 7mm obsahující 2 (i 3) semena.

Ampelocissus leonensis

Ampelocissus leptotricha

Ampelocissus lowii

Ampelocissus macrocirrha

Ampelocissus madulidii

Ampelocissus martini

Ampelocissus mesoamericana

Ampelocissus mottleyi

Ampelocissus muelleriana

Ampelocissus multifoliola

Ampelocissus multiloba

Ampelocissus multistriata

Ampelocissus nitida

Ampelocissus obtusata

Ampelocissus ochracea

Ampelocissus pauciflora

Ampelocissus pedicellata

Ampelocissus phoenicantha

Ampelocissus poggei

Ampelocissus polystachya

Ampelocissus polythyrsa

Ampelocissus pterisanthella

Ampelocissus racemifera

Ampelocissus robinsonii

Ampelocissus rubiginosa

Ampelocissus rubriflora

Ampelocissus rugosa

oblasti: Bhútán, Západní Bengálsko

Roste v Bhútánu a Indii. Kmínky jsou v mládí plstnaté. Listy jsou svrasklé, špičaté, dlouhé 13 - 35cm, široké 10 - 30cm a na spodní straně plstnaté. Květenstvím je chocholičnatý vrcholík průměru 3 - 10cm.

Ampelocissus rupicola

Ampelocissus sapinii

Ampelocissus sarcocephala

Ampelocissus schimperiana

Ampelocissus sikkimensis

oblasti: Sikkim, Yunnan

Roste v Číně a Indii v podobě dřevité liány. Větvě jsou podélně rýhované. Listy jsou jednoduché, mají 6 - 6,5cm řapík, lístky jsou hroité, zubaté, dlouhé 19 - 21cm, široké 15 - 16cm, báze srdčitá, má 5 bazálních žilek a 5 - 6 postranních žilek. Květenství vyrůstá proti listům, má velikost 3 - 5cm, stopky jsou dlouhé 8cm a vlastní květy mají 2 - 4mm stopku. Plodem je kulovitá červená bobule se zobáčkovitou bází průměru 1cm obsahující 1 - 2 podlouhlá zakulacená semena.

Ampelocissus spicifer

Ampelocissus tenuis

Ampelocissus thyrsiflora

Ampelocissus tomentosa

Ampelocissus trichoclada

Ampelocissus verschuerenii

Ampelocissus wightiana

Ampelocissus winkleri

oblasti: Borneo

Pochází z Bornea.

Ampelocissus xizangensis

oblasti: Nepál, Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu a Nepálu v podobě dřevité popínavky. Stonky jsou podélně rýhované a mohou být plstnaté. Úponky jsou 2ramenné. Listy jsou jednoduché, lístky široce vejčité, zakulacené, zubaté, zakulacené nebo tupé, dlouhé 23 - 24cm, na bázi srdčité, mají 5 bazálních žilek, 4 - 5 postranních a řapíky jsou dlouhé 15cm. Květenství vyrůstá proti listům, má 6cm stopku, povrch je plstnatý, vlastní květy mají velikost 2 - 2,5mm, 1 - 1,5mm stopku, poupata eliptická, dlouhá 2 - 2,5mm, kalich je prakticky holý a korunní lístky jsou úzce vejčité a dlouhé 1,5 - 1,8mm.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1430>

<https://www.rostliny.net/>