

Abarema (Abarema)

čeleď: Fabaceae

Roste v tropické Americe v podobě stromu nebo keře. Listy jsou 2x zpeřené. Květenstvím je hlávka, která může být samostatná anebo ve svazečcích či hroznech v paždí listů nebo na odlistěných větvích a vlastní květy jsou bohaté a mají dlouhé tyčinky. Plodem je zploštělý zahnutý až kulatý lusk a uvnitř je červený.

Abarema abbottii

oblasti: Dominikánská Republika

Roste v Dominikánské Republice v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 12m. Borka je šedá.

Abarema acreana

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Abarema adenophora

Abarema adenophorum

Abarema alexandri

oblasti: Jamajka

Patří mezi endemity Jamajky.

Abarema asplenifolia

Abarema auriculata

Abarema barbouriana

Abarema barnebyana

oblasti: Espírito Santo

Roste v Brazílii v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 1 - 5m. Větve jsou ochlupené. Palisty jsou opadavé. Listy jsou zpeřené, tvoří je 4 - 6 primárních párů na větvení délky 8 - 15cm, 4 - 12

sekundárních párů, vlastní lístky jsou přisedlé, asymetricky, na okraji drobně ochlupené, 2barevné, dlouhé 1,1 - 1,4cm, široké 6 - 8mm a řapíky jsou dlouhé 2,5 - 6cm. Květenstvím je krátký úžlabní hrozen s vršenem délky 0,5 - 1cm, stopkou délky 3cm, listen je nepatrný, vlastní květy jsou 5tičetné, bazální mají 0,2mm stopku, vrcholové jsou prakticky přisedlé, kalich je zvonkovitý, na cípech zpravidla ochlupený, dlouhý i široký 2mm, koruna je zvonkovitá, dlouhá 3mm, široká 3mm, tyčinky jsou dlouhé 3,5cm, středový květ je prakticky přisedlý, kalich zvonkovitý, dlouhý i široký 3mm, koruna je dlouhá 9mm a široká 3mm. Plodem je hnědý siťnatý lusk délky 10 - 18cm, obsahuje 10 dvoubarvých modrých a bílých čočkovitých až obvejčitých semen délky 1,2cm a šířky 8mm.

Abarema brachystachya

Abarema callejasii

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii.

Abarema campestris

Abarema centiflora

oblasti: Bolívie, Střední Andy

Roste v Andách v Bolívii.

Abarema cochleata

Abarema cochliocarpos

oblasti: Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sao Paulo

Roste v Brazílii. Dorůstá výšky i více než 10m.

Abarema commutata

oblasti: Bolívie, Guyana, Surinam, Venezuela

Roste v Guyaně, Venezuele, Surinamu a Bolívii.

Abarema cordifolia

Abarema curvicarpa

oblasti: Brazílie, Francouzská Guyana, Guyana, Surinam

Roste v Brazílii, Guyanách a Surinamu.

Abarema cyclosperma

Abarema ferruginea

Abarema filamentosa

oblasti: Bahia, Espírito Santo

Roste v Brazílii.

Abarema floribunda

Abarema gallorum

Abarema ganymedea

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Roste v Kolumbii a Ekvádoru.

Abarema glauca

oblasti: Dominikánská Republika, Kuba, Venezuela

Roste na Kubě, Dominikánské Republice a Venezuele.

Abarema idiopoda

oblasti: Belize, Guatemala

Roste v Guatemale a Belize v podobě stromu. Dorůstá výšky do 20m při průměru kmene až 45cm. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou zpeřené, tvoří je zpravidla 3 - 4 primární páry, 12 - 20 sekundárních, vlastní lístky jsou tupé, dlouhé 0,9 - 1,8cm, báze je prakticky uťatá a spodní strana může být ochlupená. Květenstvím je úžlabní, párovitá krátká až protáhlá kulovitá hlávka, vlastní květy jsou přisedlé, kalich drobně ochlupený, dlouhý 2,5mm, cípy špičaté, koruna je bílá, aromatická, ochlupená a dlouhá 6,5mm. Plodem je protáhlý dlouze stopkatý lusk délky 10 - 18cm a šířky 2 - 2,5cm.

Abarema josephi

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii.

Abarema jupunba

oblasti: Jižní Amerika

Roste v tropické Americe v podobě stromu. Dorůstá výšky do 20m. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou malé až zakrnělé. Listy jsou zpeřené, tvoří je 2 - 4 (i 6) primárních párů, 3 - 8 sekundárních, vlastní lístky jsou zkoseně kosočtvercovité, vejčité nebo obvejčité, nestejně, kožovité, lesklé, síťkované dlouhé do 6cm a na spodní straně ochlupené. Kvete samostatnými květy, v hlávkách nebo okolících, květenství má 5 - 9cm stopku, kalich má délku 2 - 3mm a koruna je dlouhá 4 - 6mm. Plodem je kožovitý kulatý tmavěhnědý lusk šířky 0,8 - 1,6cm a obsahuje semena průměru 7mm.

Abarema killipii

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, S Andy

Roste v Kolumbii a Ekvádoru.

Abarema laeta

Abarema langsdorffii

oblasti: JV Brazílie

Roste na pobřeží v Brazílii.

Abarema langsdorffii

oblasti: JV Brazílie

Roste na pobřeží v Brazílii.

Abarema lehmannii

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii.

Abarema leucophylla

Abarema levelii

Abarema limae

oblasti: Espírito Santo, Rio de Janeiro

Roste v Brazílii v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 5m. Větve jsou ochlupené. Palisty jsou opadavé. Listy jsou zpeřené, tvoří je 4 - 9 primárních párů na větvi délky 25 - 35cm, 4 - 16 sekundárních, vlastní lístky jsou přisedlé, 2barvé, asymetricky, mírně kosočtvercovité, špičaté, na okraji drobně ochlupené, dlouhé 1,8 - 2,5cm, široké 0,7 - 1cm a řapíky jsou dlouhé 3 - 6cm. Květenstvím je hrozen délky 0,5 - 1cm na 5cm stopce, listen je nepatrný, vlastní květy jsou 5tičetné, bazální mají 2 - 4mm stopku, kalich zvonkovitý, délky 3mm, šířky 2mm, cípy zpravidla ochlupené, vrcholové květy jsou prakticky přisedlé, kalich zvonkovitý, dlouhý 3mm, široký 2mm, na cípech zpravidla ochlupený, koruna je zvonkovitá, jemně ochlupená, dlouhá 7mm, široká 3mm a tyčinky jsou dlouhé 3,2cm, středový květ je prakticky přisedlý, kalich zvonkovitý, ochlupený, dlouhý i široký 3mm, koruna je zvonkovitá, jemně ochlupená, dlouhá 1,3cm a široká 5mm. Plodem je hnědý síťnatý lusk délky 12 - 20cm a obsahuje 8 - 10 dvoubarvých čočkovitých semen délky 0,8 - 1,2cm a šířky 6 - 8mm.

Abarema longipedunculata

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele.

Abarema lovellae

Abarema macradenia

Abarema mataybifolia

Abarema microcaly

Abarema muellerana

Abarema nipensis

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Abarema obovalis

Abarema obovata

oblasti: Minas Gerais

Roste v Brazílii.

Abarema oppositifolia

Abarema oxyphyllidia

oblasti: Honduras

Roste v Hondurasu.

Abarema piresii

oblasti: Pará

Roste v Brazílii.

Abarema racemiflora

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice.

Abarema ricoae

Abarema turbinata

oblasti: Bahia

Roste v Brazílii.

Abarema villifera

oblasti: Bolívie, Brazílie, Venezuela

Roste v Brazílii, Venezuele a Bolívii.

Abarema villosa

oblasti: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro

Roste v Brazílii v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 1,5 - 5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou opadavé, čárkovité, ochlupené a dlouhé 1mm. Listy jsou zpeřené, tvoří je 1 - 5 primárních párů na 4 - 10cm větvení, 2 - 8 sekundárních párů, vlastní lístky jsou přisedlé,

asymetrické, kopinaté, špičaté, dlouhé 3 - 6cm, široké 1,2 - 3cm a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 5,5cm. Květenstvím je úžlabní hustý hrozen délky 0,5 - 1cm na 3 - 7cm stopce, listen čárkovitý, opadavý, dlouhý 1 - 2mm, vlastní květy jsou 5tičetné, bazální mají 1 - 1,5mm stopku, vrcholové jsou prakticky přisedlé, kalich zvonkovitý, ochlupený, dlouhý i široký 2 - 3mm, koruna je zvonkovitá, jemně ochlupená, dlouhá 6mm, široká 3mm a tyčinky jsou dlouhé 3cm. Plodem je hnědý síťnatý lusk délky 8 - 18cm, obsahuje 3 - 16 dvoubarvých bílých a modrých čočkovitých až kulatých semen délky 7 - 8mm a šířky 5 - 7mm.

Abarema zollerana

Abarema zolleriana

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3886>

<https://www.rostliny.net/>