

Clinacanthus nutans (Hadí tráva)

synonyma: *Clinacanthus burmanni*, *Clinacanthus burmanni* var. *robinsonii*, *C. var. robinsonii*, *Clinacanthus siamensis*, *Justicia nutans*

čeleď: Acanthaceae

oblasti: Asie, Čína, Indočína, Indonésie, JV Asie, Malajsie, Malesie, Thajsko, V Asie, Vietnam

Roste v Číně, Indonésii, Malajsii, Thajsku a Vietnamu v podobě keře. Dorůstá výšky do 1 (i 2,5)m. Kmínky jsou kulaté, dřevnaté a olývávají. Listy jsou vejčitékopinaté až kopinaté, v mládí oboustranně ochlupené, prakticky celokrajné až vykrajovaně vroubkované, zašpičatělé, dlouhé (7 -) 8 - 12cm, široké (1 -) 4 (i 6)cm, spodní strana je podél 4 - 6ti párů žilek ochlupená, báze klínovitá až zakulacená a řapíčky jsou dlouhé 0,3 - 2cm. Květenstvím je 1 až několik hrozný na koncích větví, zpravidla po 3ks ve vrcholové latě, vřeteno je žláznatě ochlupené, listeny i listence jsou čárkovité, špičaté, dlouhé 8mm, široké 2mm, na spodní straně žláznatě ochlupené, vlastní květy mají kalich délky 0,9 - 1,3cm, laloky čárkovité, špičaté, vně žláznatě ochlupené, koruna je červená se zelenou bází, vně žláznatě ochlupená, dlouhá 3 - 4,2cm, trubka je na bázi válcovitá, široká 3mm, dlouhá 5mm, na vrcholu rozšířená až na 6mm, spodní pysk je žlutě pruhovaný, dlouhý 1 - 2cm, široký 1cm, horní pysk je vejčitý, dlouhý 3 - 5mm a široký 1 - 2mm. Plodem je ochlupená tobolka délky 2cm obsahující semena průměru 2mm. Využívá se v medicíně.

<http://www.rostliny.net/>