

Anthericum liliago (Bělozářka liliovitá)

čeleď: Asparagaceae

oblasti: Andalusie, Česká republika, Itálie, Katalánsko, Malá Asie (Anatolie), Německo, Polsko, S Afrika, Švýcarsko

Pochází z Evropy, severní Afriky a Turecka. Patří mezi trvalky. Pod zemí vytváří krátký oddenek s bohatým kořenovým systémem. Dorůstá výšky 30 - 70 (i 90)cm. Listy má úzké, čárkovité, šedozelené, dlouhé 12 - 40cm, široké 7mm a jsou téměř všechny umístěné v přízemní listové růžici. Kvete v jednostranném 6 - 10tičetném hroznu liliovitými květy o průměru (2,5 -) 3 - 4 (i 5)cm, korunní lístky jsou bílé, uprostřed s nazelenalou žilkou, dlouhé 1,5 - 2,2cm, min. o 5mm delší než tyčinka. Plodem je vejčitá tobolka s černými semeny. Patří mezi ohrožené druhy C3. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. major/'Major' - květy větší, čistě bílé

Vyhovují ji dobře propustné půdy, kamenité stráně a jiné sušší stráně, zásadité půdy a plné slunce. Je mrazuvzdorná.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>