

Comandra

čeleď: Santalaceae

Existuje pouze 1 druh.

Comandra umbellata

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Středozeší, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste v Severní Americe a středozeší jako trvalka a poloparazitická rostlina. Parazituje na rodech Acer, Antennaria, Aster, Betula, Carex, Solidago, Fragaria, Populus, Quercus, Rubus, Vaccinium a některých trávách. Dorůstá výšky 8 - 34cm. Listy jsou střídavé a dlouhé do 3,3cm. Květy tvoří 5 zelenobílých kališních lístků bez korunních lístků. Plodem je bobule šířky 4 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. californica
- subsp. elegans/C. elegans
- subsp. pallida

Vyhovují jí sušší půdy.

<https://www.rostliny.net/>