

Comandra umbellata

čeleď: Santalaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Středozeří, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste v Severní Americe a středozeří jako trvalka a poloparazitická rostlina. Parazituje na rodech Acer, Antennaria, Aster, Betula, Carex, Solidago, Fragaria, Populus, Quercus, Rubus, Vaccinium a některých trávách. Dorůstá výšky 8 - 34cm. Listy jsou střídavé a dlouhé do 3,3cm. Květy tvoří 5 zelenobílých kališních lístků bez korunních lístků. Plodem je bobule šířky 4 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. californica
- subsp. elegans/C. elegans
- subsp. pallida

Vyhovují ji sušší půdy.

<https://www.rostliny.net/>