

# Polianthes (Tuberóza)

čeleď: Asparagaceae

Rodové jméno pochází z řeckých slov polios = bělavý a anthos = květina. Roste v Mexiku. Vytváří cibulovitou hlízu ze které vyrůstají řemenovité listy. Stonky jsou také olistěné. Květenství je hroznovité, vlastní květy jsou párovité, umístěné v paždí listenů, trubkovité, bílé, červené nebo oranžové a aromatické. Plodem je 3pouzdrá tobolka. Nejznámějším druhem je *P. tuberosa*.

Polianthes bicolor

Polianthes densiflora

Polianthes durangensis

oblasti: Durango

Polianthes elongata

Polianthes geminiflora

Polianthes howardii

Polianthes longiflora

Polianthes michoacana

Polianthes montana

Polianthes multicolor

Polianthes nelsonii

Polianthes oaxacana

oblasti: Oaxaca

Polianthes palustris

## Polianthes platyphylla

## Polianthes pringlei

## Polianthes sessiliflora

## Polianthes tuberosa

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku. Vytváří hlízy podobné cibuli. Vyrůstají z ní pevné řemenovité až 30 (i 60)cm dlouhé trávovité listy. Květní stvol má výšku 0,5 - 1m, občas jich může být i více (až 5ks), má řídké a krátké lístky a na vrcholu je dlouhý klasovitý až 30tičetný hrozen. Vlastní květy jsou výrazně aromatické, otevírají se v noci, dlouho vydrží, jsou voskovité, úzce trubkovité, na bázi se zelenými listeny, koruna je široce rozevřená a tvoří ji 6 bílý korunních lístků, které mohou mít narůžovělé špičky. Plody obsahují mnoho semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Mexican' - květy jednoduché, velké
- 'Tall Double' - květy plnokvěté
- 'The Pearl'/'Exelsior Perle' - květy plnokvěté

Vyžaduje teplotu min. 15°C, půdu bohatou na živiny a postupně s růstem přihnojování. Po odkvětu se záливka zmírní a přestane se zcela hnojit. Kvetením se rostlina vysiluje a může trvat i několik let, než znovu vykvete.

Množí se dceřinými hlízkami.

## Polianthes zapopanensis

<https://www.rostliny.net/>