

Nassauvia (Holaska)

čeleď: Asteraceae

Roste v Argentině, Bolívii, Čile a Falklandských ostrovech v podobě trvalky, polokeře nebo keře. Listy jsou malé, zpravidla tuhé. Květenstvím je zpravidla přisedlý bílý úbor buď samostatný anebo v kulovitěm či vejčitém květenství.

Nassauvia aculeata

oblasti: J Argentina, J Čile, Ohňová země, Střední Čile, SZ Argentina

Roste v Čile a Ohňové zemi v podobě trvalky nebo polokeře. Dorůstá výšky (3 -) 10 - 15 (i 20)cm. Povrch je řídce jemně ochlupený. Stonky jsou vystoupavé až vzpřímené. Listy jsou střídavé, přisedlé, vytvářejí růžice, jsou čárkovité až úzce kopinaté, hroťité, tuhé, mohou být ochlupené, zpravidla s 1 - 2ma páry dlouhých ostnů, dlouhé 0,5 - 2,5cm a široké 1 - 4mm. Květenstvím je úbor, který může být seskupený v chudém chocholíku, zákrovní listeny jsou 2řadé, vnitřní jsou delší vnějších, kopinaté, bledězelené s hnědým pruhem podél střední žilky, zpravidla na okraji blanité, trnité a dlouhé 6,5 - 8mm, vlastní úbor mívá 5 květů, květy jsou jazykovité, oboupohlavné, 2pyské, bílé nebo růžové, vnější pysk má 3 zuby, délku 3 - 3,5mm, vnitřní je kratší a 2klaný. Plodem je nažka délky 3mm s chmýrem.

Vyhovují ji mělké písčité půdy, skály či suché trávníky.

Nassauvia ameghinoi

oblasti: Chubut, Santa Cruz

Roste v Argentině. Listy jsou střežovitě, vejčité, zahnuté, dlouhé 2mm a na spodní straně ochlupené. Květenstvím je přisedlý úbor.

Nassauvia argentea

oblasti: Chubut, J Čile, Los Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, S Čile, Santa Cruz

Roste v Argentině a Čile v trsech trvalek až polokeřů. Dorůstá výšky 5 - 25cm. Stonky jsou vystoupavé. Listy jsou střežovitě, přisedlé, přitisklé, spodní vyhnuté, vejčité, špičaté, hroťité, dlouhé 0,6 - 1cm, široké 5 - 6mm, na líci jemně podélně žebrované, jemně ochlupené a plstnaté. Květenstvím je úbor seskupený do strboulu, zákrov má délku 7mm, vnější listeny čárkovité, vnitřní obkopinaté, na vrcholu ochlupený, vlastní úbor tvoří 5 květů s 6,5mm dlouhou bílou trubkovitou korunkou. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia argyrophylla

oblasti: Chubut, Río Negro, Santa Cruz

Roste v Argentině. Povrch je ochlupený. Listy jsou tuhé, kanálkovité, úzké, špičaté, ochlupené, ostnitě zubaté a dlouhé 1 - 4cm. Květenstvím jsou úbory seskupené do kulovitěho květenství o šířce 3cm.

Nassauvia axillaris

oblasti: Bolívie, J Argentina, Střední Čile, SZ Argentina

Roste v Argentině, Bolívii a Čile v podobě sivozeleného keře. Dorůstá výšky 20 - 50cm. Listy jsou čárkovité, trnitě, tuhé a dlouhé 1 - 3cm. Květenstvím je bílý úbor po 1 - 3ks v klubku na 0,3 - 1cm stopce.

Vyhovují ji dobře propustné půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia chubutensis

oblasti: Chubut

Roste v Argentině. Lodyhy mohou být šedě plstnaté. Listy jsou vejčité, na vrcholu s 3jitým trnem, na okraji s 1 - 2ma páry trnů, objímavé a mohou být mírně ochlupené. Květenstvím je samostatný úbor.

Nassauvia coronipappa

Nassauvia cumingii

oblasti: Střední Čile, SZ Argentina

Roste v Argentině a Čile. Povrch je našedlý. Listy jsou úzce kopinaté, trnitě, ostnitě zubaté a dlouhé 1 - 3cm. Květenství je kulovité, zpravidla umístěné mezi listy.

Nassauvia darwinii

oblasti: J Argentina, J Čile

Roste v Argentině a Čile v podobě keře. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Listy jsou čárkovité, hroťité, tuhé, hustě ochlupené a dlouhé 0,5 - 2,5cm. Květenstvím je zpravidla samostatný bílý úbor, ale poupata jsou růžová.

Vyhovují ji chudé písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia dentata

oblasti: J Argentina, J Čile, Střední Čile

Roste v Argentině a Čile v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Listy jsou husté, vejčité kopinaté, špičaté, na bázi pilovité a dlouhé 1cm. Květenstvím je klas složený z bílých úborů.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia digitata

oblasti: Biobío, Maule, Neuquén

Roste v Argentině a Čile. Spodní listy jsou husté, střechovité, celkově obvejčité, peřenoklané a osténkatě pilovité a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je hustý kulovitý klas složený z úborů.

Nassauvia dusenii

oblasti: Aysén, Chubut, Magalhaesův region a chilská Antarktida, Río Negro, Santa Cruz

Roste v Argentině a Čile v trsech. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Listy jsou vejčité kopinaté, pilovité s hrotem, zahnuté, žilkované a řídce ochlupené. Květenstvím je klubko složené s bílých úborů.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia fuegiana

oblasti: Chubut, Mendoza, Neuquén, Ohňová země, Río Negro, Santa Cruz

Roste v Argentině. Listy jsou úzce šídlovité, hroťité, zahnuté, ochlupené a pochvaté. Květenstvím je samostatný úbor. Plodem je ochlupená nažka.

Nassauvia gaudichaudii

oblasti: Falklandy

Roste na Falklandských ostrovech v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Stonky jsou hustě větvené. Listy jsou malé, střechovité, zahnuté, kopinaté, trnitě zubaté a tupé. Květenstvím je bílý úbor.

Vyhovují ji skalnatá místa, mírná zálivka, dostatek živin a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia glomerata

oblasti: Biobío, Maule, Mendoza, Neuquén, O'Higgins, Santiago Metropolitan

Roste v Argentíně a Čile v polštářovitých porostech. Listy jsou husté, kopinaté, zašpičatělé, vykrajovaně trnitě pilovité a žilnaté. Květenstvím je krátký kulovitý klas složený z bílých úborů s 2řadým zákrovem.

Nassauvia glomerulosa

oblasti: J Argentina, J Čile, SZ Argentina

Roste v Argentíně a Čile. Listy jsou úzce šídlovité, trnitě, pochvaté, eliptické, špičaté, na 1mm brachyblastech a vytvářejí kulatá klubka. Květenstvím je klas složený z úborů.

Nassauvia hillii

oblasti: Neuquén

Roste v Argentíně v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 8cm. Listy jsou úzce šídlovité, trnitě zubaté, zahnuté a z části pochvaté. Květenství tvoří 1 - 2 bílé úbory. Plodem je nažka.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia juniperina

oblasti: Chubut, Santa Cruz

Roste v Argentíně v polštářových porostech polokeřů. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou čárkovité, hrotné, ochlupené, dlouhé 2 - 5mm a na bázi drobně zubaté. Květenstvím je samostatný bílý úbor.

Vyhovují ji chudé písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia lagascae

oblasti: J Čile, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Střední Čile

Roste v Argentíně a Čile jako trvalka ve voskovitě vyhlížejícími růžicemi. Stonek je poléhavý až vzpřímený a dlouhý 3 - 4cm. Listy jsou podlouhlé, kopistěvitě až obvejčité, střežovité, s 5 - 9ti zuby, občas ochlupené a dlouhé 0,4 - 1,3cm. Plodem je přisedlý úbor v hlávce s průměrem 1 - 1,5 (i 4)cm, zákrov má délku 5mm, šířku 2,5mm, zákrovní listeny 2řadé, úbory tvoří zpravidla 5 květů, ty jsou oboupohlavné, koruna 2pyská, bílá nebo nafialovělá (i růžová). Plodem je nažka s chmýrem. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. lanata - výška 4 - 8cm; listy ochlupené; hlávka průměru 1 - 1,5cm, květy bílé a modrofialové

- var. globosa - hlávka průměru 2 - 4cm

Vyhovují ji skalnatá místa.

Nassauvia latissima

oblasti: Magalhaesův region a chilská Antarktida, Ohňová země

Roste v Čile a Ohňové zemi v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Listy jsou široce obvejčité, 3roze zubaté, ochlupené a dlouhé 1 - 3mm. Květenství je kulovité, průměru 2 - 3cm a tvoří je bílé úbory.

Vyhovují ji kamenitá půda bohatá na živiny, vlhko a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia looseri

oblasti: Santiago Metropolitan

Roste v Čile v podobě ochlupeného keře. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy jsou husté, kopinaté, trnitě zubaté a na vrcholu s dlouhým trnem. Květenstvím je úžlabní hlávka složená s bílých úborů.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia maeviae

oblasti: Magalhaesův region a chilská Antarktida, Santa Cruz

Roste v Argentině a Čile. Listy jsou čárkovité, střechovité, uťatá, prakticky holé a dlouhé 1 - 3mm. Květenstvím je úbor. Plodem je ochlupená nažka.

Nassauvia magellanica

oblasti: Magalhaesův region a chilská Antarktida, Ohňová země, Santa Cruz

Roste v Argentině, Čile a Ohňové zemi jako dřevnatějící trvalka v kompaktních polštářích. Dorůstá výšky 8 - 40cm. Listy jsou střechovité, střídavé, spodní podlouhlé až kopinaté, špičaté, dlouhé 1,5 - 3,5cm, široké 0,6 - 1,5cm, mají 4 - 5 párů zubů, vyšší jsou kopinaté, mírně zvlněné, zašpičatělé, dlouhé 1 - 3cm a široké 0,4 - 1cm. Květenstvím je úbor ve strboulu o průměru 2 - 3cm, 5 vnějších zákrovních listenů má tvar kopinatý s hrotem, délku 0,9 - 1,1cm, vnitřní jsou kratší a čárkovité, vlastní úbory jsou symetrické, oboupohlavné, bílé, vydávají aroma vanilky nebo čokolády, korunní trubka má délku 3 - 4,5mm, vnější pysk je 3zubý, dlouhý 3 - 4,5mm, vnitřní jsou kratší a 2klané. Plodem je žebrovaná nažka délky 3,5 - 4,5mm s chmýrem.

Vyhovují ji kamenitá místa s mělkými vlhkými půdami.

Nassauvia nivalis

Nassauvia pentacaenoides

oblasti: Santa Cruz

Roste v Argentině v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou střechovité, úzce šídlovité a pochvaté. Kvete v úboru bílými květy.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, nízká zálivka a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia pinnigera

oblasti: Maule, Mendoza, Neuquén, O'Higgins, Santiago Metropolitan, Valparaíso

Roste v Argentině a Čile. Listy jsou husté, úzce kopinaté, žilnaté, hrotité, zubaté, zahnuté a ochlupené. Květenstvím je klubko složené z úborů. Plodem je nažka.

Nassauvia planifolia

oblasti: Mendoza, Neuquén, Santa Cruz

Roste v Argentině v trsech. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy jsou vejčité kopinaté, zašpičatělé, hrotité, asymetricky zubaté a 1/2objímavé. Květenstvím je kulovitá až vejčitá hlávka tvořená z bílých úborů.

Vyhovují ji chudé písčité půda, vlhko a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia pulcherrima

oblasti: Neuquén, Río Negro

Roste v Argentině. Listy jsou vejčité nebo eliptické, hrotité, 1/2objímavé a nápadně žilkované. Květenstvím je klubko složené z úborů. Plodem je nažka.

Nassauvia pumila

oblasti: Araucanía, Biobío, Chubut, Los Lagos, Neuquén

Listy jsou husté, mírně obvejčité, špičaté, ochlupené a dlouhé 2mm. Květenstvím je klubko složené z úborů a zákrov je nepatrně 2řadý.

Nassauvia pygmaea

oblasti: Araucanía, Aysén, Los Lagos, Magalhaesův region a chilská Antarktida, Ohňová země, Santa Cruz

Roste v Argentině, Čile a Ohňové zemi jako trvalka. Stonek je poléhavý nebo vystoupavý a dlouhý (2 -) 5 - 10 (i 15)cm. Listy jsou střečovité, střídavé, vejčité až kopinaté nebo jehlicovité, hroité, dlouhé 3 - 6mm, široké 1 - 3mm, v horní části tlusté, pod špičkou s 1 párem tlustých trnů. Květenstvím je úbor ve strboulu o průměru 0,8 - 1,3cm, zákrovní listeny holé, vnější krátké, vnitřních 5 je obkopinatých, dlouhých 4 - 5mm, zelených až růžovofialových, hroitých, vlastní květy jsou oboupohlavné, bílé, 2pyské, krátce trubkovité, vnější pysk je 3zubý, dlouhý 1,5 - 2mm, vnitřní jsou krátké a 2klané. Plodem je obvejčitá žebrovaná nažka délky 1,5 - 2mm s chmýrem.

Vyhovují ji skalnatá místa, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia pyramidalis

oblasti: Biobío, Maule, Mendoza, Neuquén, O'Higgins, Santiago Metropolitan

Roste v Argentině a Čile jako trvalka. Stonek je vystoupavý až vzpřímený, dlouhý 20 - 40cm. Listy jsou husté, střídavé, 1/2objímavé, střečovité, kopinaté až vejčité, hroité (hrot délky 0,2 - 1cm), se 7 - 9ti krátkými ostnitými zuby, dlouhé 0,5 - 1,2cm a široké 0,5 - 1cm. Květenstvím je úbor v prakticky kulatém až protáhlém klasu, zákrov je válcovitý, dlouhý do 1,5cm, vnější zákrovní listeny krátké, vnitřních je 5, jsou kopinaté, ostnité a stříbřitě ochlupené, vlastních květů je v úboru 5ks, jsou bílé, 2pyské, vnější pysk je delší vnitřního a koruna má délku 1cm. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují ji kamenitá místa.

Nassauvia ramosissima

oblasti: Biobío, Los Lagos, Maule, O'Higgins

Roste v Čile. Povrch je sivozelený. Listy jsou vejčité, špičaté, ostře pilovité a ochlupené. Květenstvím je hustý klas délky 2 - 3cm složený z úborů a zákrovní listeny jsou čárkovité.

Nassauvia revoluta

oblasti: J Čile, Patagonie, Střední Čile, SZ Argentina

Roste v Argentině a Čile v podobě vystoupavého keře. Dorůstá výšky do 20cm. Listy jsou husté, střečovité, vejčité až vejčitékopinaté, na vrcholu hroité zubaté, dlouhé 0,5 - 0,7 (i 1)cm a široké 6mm. Květenstvím je úbor v klubíčku či kulovitém klasu o velikosti 2 - 2,5 (i 3)cm, vlastní květy jsou bílé a vnější zákrovní listeny čárkovité, kratší vnitřních.

Nassauvia ruizii

oblasti: Mendoza

Roste v Argentině v trsech. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Listy jsou vejčité, pilovité, žilnaté, 1/2objímavý a ochlupené. Květenstvím je hlávka složená z bílých úborů. Plodem je nažka.

Vyhovují ji kamenité vlhké půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia sceptrum

oblasti: Santa Cruz

Roste v Argentině. Listy mohou být zubaté, žilnaté, spodní kopinaté a horní užší. Květenstvím je podlouhlý klas složený z úborů. Plodem je nažka.

Nassauvia serpens

oblasti: Falklandy

Roste na Falklandských ostrovech, kde roste v méně než 250 exemplářích. Listy jsou střečovité, úzce kopinaté, špičaté s hrotem, dlouhé 1,2 - 1,8cm a na spodní straně ochlupené. Květenství je vejčité a široké 2,5cm.

Vyhovují ji skalnatá místa.

Nassauvia sprengelioides

oblasti: Araucanía, Biobío, Maule, Neuquén

Roste v Argentině a Čile v trsech. Dorůstá výšky 20 - 25cm. Listy jsou střečovité, vejčité, objímavé, trnitě špičaté, pilovité, žilnaté a na spodní straně ochlupené. Květenstvím je podlouhlý klas složený z úborů.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia sublobata

oblasti: Mendoza, Neuquén

Roste v Argentině. Listy jsou úzce vejčitékopinaté, hrotité, zubaté nebo laločnaté a mohou být ochlupené. Květenstvím je hlávka složená z úborů.

Nassauvia ulicina

oblasti: Chubut, J Čile, Río Negro, Santa Cruz

Roste v Argentině a Čile v podobě keře. Dorůstá výšky 5 - 20cm. Listy jsou šídlovité, ostré,

střechovité a na bázi pochvaté. Květenstvím je 1 - 3četné, složené z bílých úborů a zákrovní listeny jsou chudé. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují ji chudé písčité půdy a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Nassauvia uniflora

oblasti: Coquimbo, Mendoza, San Juan, Santiago Metropolitan, Valparaíso

Roste v Argentině a Čile. Listy jsou husté, úzce kopinaté a mají 1 - 3 velké trnité zuby. Květenstvím je úžlabní přisedlý úbor s válcovitým zákrovem.

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2137>

<https://botany.cz/cs/nassauvia-magellanica/>

<https://www.rostliny.net/>