

Ceriops (Ceriops)

čeleď: Rhizophoraceae

Roste v tropech v porostech mangrovů v podobě stálezeleného keře nebo nižšího stromu. Kmínky mají přitisklé chůdovité kořeny (pneumatofory) o výšce až 1m. Palisty jsou kopinaté. Listy vyrůstají do kříže, jsou seskupené na vrcholcích větví, jsou kožovité, na spodní straně černě tečkované a žilnatina je nevýrazná. Květenství je max. krátce stopkaté, 2 - 4květé až mnohokvěté, vrcholičnaté, mají 2 listence na bázi květu, částečně srostlé, pohárkovité, květy jsou oboupohlavné, kalich je hluboce 5 - 6laločný, korunní lístky jsou bílé, v počtu 5 - 6ks a každá po 2 tyčinkách. Plodem je kožovitá vejčitá bobule s růžkovitě ohnutými kališními lístky a obsahuje 1 semeno. Klíčí již na mateřské rostlině s vytváří semenáš s hladkým špičatým zeleným hypokotylem délky 15 - 30cm, šířky 2cm, sloužícím k zachycení v bahně a zároveň se zásobami živin. Nejznámějším druhem je C. tagal.

Ceriops australis

Ceriops decandra

oblasti: Austrálie, Bangladéš, Indie, Myanmar (Barma), Nová Guinea, Thajsko

Roste od Indie po Novou Guineu a Austrálii v podobě stromu v prostředí mangrovů. Dorůstá výšky do 5 (i 15)m při průměru kmene 15 - 30cm. Palisty jsou dlouhé 1,5 - 2,5cm. Listy jsou úzce obvejčité až eliptické, tupé, zakulacené nebo i vykrojené, dlouhé 4 - 10cm, široké 2 - 6cm a báze je klínovitá. Květenství je 3 - 5tikvěté, vyrůstá zpravidla v paždí list na max. 1cm stopce, vlastní květy jsou přisedlé až téměř přisedlé, kališní lístky vejčité, špičaté, dlouhé 2 - 4mm, korunní lístky jsou bílé, později nahnědlé, trásnitě rozeklané a dlouhé 2,5mm. Plody jsou vejčitě kuželovité, dlouhé 1 - 1,8cm, kališní laloky jsou zkoseně vzpřímené nebo vystoupavé a mají kyjovitý hypokotyl délky 6 - 15cm.

Ceriops pseudodecandra

oblasti: Austrálie, Papua-Nová Guinea

Roste v Austrálii a Papui-Nové Guineji.

Ceriops tagal

oblasti: Filipíny, Indie, Indonésie, J Čína, Jihoafrická Republika (JAR), Madagaskar, Nová Guinea, Nová Kaledonie, Pákistán, S Austrálie, Somálsko, Srí Lanka, Tichý oceán

Roste kolem Indického oceánu až po Polynésii v mangrovech v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1,8 - 6 (i 25)m. Vytváří prstovité vzdušné kolenovité ohnuté kořeny, občas s lištovitými náběhy. Borka je bledě šedohnědá, hladká až vláknitá. Palisty záhy opadávají a jsou dlouhé 1,3 - 2,5cm. Listy jsou vstřícné, eliptické až obvejčité, žlutozelené, kožovité, téměř dužnaté, zakulacené nebo tupé (i mírně vykrojené), okraj může být zvlněný, dlouhé (3 -) 7 - 10 (i 11,5)cm, široké (1,5 -) 2

- 5 (i 7,5)cm, báze zúžená, klínovitá a řapíky jsou dlouhé (1 -) 1,5 - 3,5cm. Květenstvím je (2 -) 4 - 10tikvětý strboulovitý vrcholík na až 10cm stopce, listeny a listence jsou dlouhé 2mm, vlastní květy jsou dlouhé 6 - 8mm, bílé, 4 - 6tičetné, kalich zelený, má délku 5mm, kališní lístky světlezelené, vejčité až 3úhlé, zašpičatělé, dlouhé 3mm, koruna je bělavá, korunní lístky jsou podlouhlé, dlouhé 3mm a široké 1mm. Plody jsou vejčité, dlouhé 1,5 - 2,5cm, na bázi s růžkovitě ohrnutými kališními lístky. Klíčí již na mateřské rostlině a vytváří mečovitý hranatý zelený hypokotyl délky 15 - 25cm, šířky 2cm, který slouží pro zakotvení semenáčku v bahnu.

Ceriops zippeliana

oblasti: Filipíny, Jáva, Kalimantan, Kambodža, Malajsie, Malajský poloostrov, Melanésie, Papua-Nová Guinea, Sabah, Sarawak, Sulawesi (Celebes), Thajsko, Vietnam

Roste v jihovýchodní Asii.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1858>

<https://botany.cz/cs/ceriops-tagal/>

<https://www.rostliny.net/>