

Cymbopogon

čeleď: Poaceae

Roste v subtropech a tropech Asie, Austrálie a Oceánie, ale i z Afriky jako trvalka a vyšší aromatická tráva v trsech. Listy bývají dlouhé a zpravidla drsné. Květenstvím je lata složená z párovitých klásků (i osinatých) v paždí nadmutého listenu. Nejznámějším druhem je *C. citratus*, tzv. citrónová tráva.

Potřebuje dobře propustnou lehkou půdu bohatou na živiny a teplo.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

Cymbopogon ambiguus

synonyma: *Andropogon ambiguus*, *Andropogon exaltatus* var. *ambiguus*, *Andropogon spectabilis*, *C. exaltatus* var. *ambiguus*

oblasti: Austrálie

Pochází z Austrálie.

Potřebuje plné slunce. Je tolerantní k vysušené půdě.

Množí se semeny.

Cymbopogon annamensis

synonyma: *C. bassacensis*, *C. martini* var. *annamensis*

Cymbopogon bhutanicus

Cymbopogon bombycinus

synonyma: *Andropogon bombycinus*, *Andropogon exaltatus* var. *lanatus*, *Andropogon lanatus*, *Andropogon procerus* var. *schultzii*, *C. exaltatus* var. *lanatus*, *C. lanatus*, *C. nardus* var. *bombycinus*, *C. nardus* var. *lanatus*, *C. nardus* var. *schultzii*, *C. procerus* var. *schultzii*, *C. schultzii*, *Sorghum bombycinum*

oblasti: Austrálie

Pochází z Austrálie.

Cymbopogon caesius

synonyma: *Andropogon bicornis*, *Andropogon caesius*, *Andropogon connatus*, *Andropogon excavatus*, *Andropogon foliatus*, *Andropogon nardoides* var. *minor*, *Andropogon schoenanthus* var. *caesius*, *Andropogon schoenanthus* var. *gracillimus*, *C. connatus*, *C. connatus* var. *muticus*, *C. excavatus*, *C. giganteus* var. *madagascariensis*, *C. plicatus*, *C. suaveolens*, *Gymnanthelia connata*

oblasti: Arabský poloostrov, Balúčistán, Indie, Jihoafrická Republika (JAR), Sindh, Srí Lanka, Súdán

Roste v Indii, Pakistánu, Srí Lance, Arabském poloostrově a od Súdánu po JAR v podobě trvalky. Pod zemí vytváří dřevnatý oddenek. Dorůstá výšky 0,3 - 1,2m. Listy jsou čárkovité, bledězelené, dlouhé 5 - 30cm, široké 0,15 - 0,8 (i 1)cm. Květenstvím je falešný úzce podlouhlý vzpřímený klas délky 5 - 20 (i 30)cm a hrozny jsou dlouhé 1 - 1,5cm.

Cymbopogon calcicola

Cymbopogon calciphilus

Cymbopogon cambogiensis

synonyma: Andropogon cambodiensis, C. siamensis

Cymbopogon citratus (Citrónová tráva)

synonyma: Andropogon cerifer, Andropogon ceriferus, Andropogon citratus, Andropogon citriodorus, Andropogon fragrans, Andropogon nardus subsp. ceriferus, Andropogon nardus var. ceriferus, Andropogon roxburghii

oblasti: Florida, JV Asie, Portoriko

Roste v jihovýchodní Asii v trsech. Dorůstá výšky 1,2 - 1,5 (i 1,8)m. Stonek je dužnatý. Listy jsou trávovité, šedozelené a při narušení vydávají citrónové aroma.

Potřebuje plné slunce a pravidelnou závlivu. Není mrazuvzdorná, přezimujte ji v místnosti s min. teplotou 10°C.

Množí se semeny.

Cymbopogon citriodora

oblasti: Indie, Střední Asie

Pochází z Indie.

Cymbopogon clandestinus

synonyma: Andropogon clandestinus, Andropogon schoenanthus subsp. clandestinus

Cymbopogon coloratus

synonyma: Andropogon coloratus, Andropogon nardus subsp. glomeratus, Andropogon nardus var. coloratus

Cymbopogon commutatus

synonyma: *Andropogon commutatus*, *Andropogon commutatus* var. *flavicundus*, *Andropogon commutatus* var. *violaceus*, *Andropogon flavicundus*, *Andropogon floccosus*, *C. commutatus* var. *jammuensis*, *C. divaricatus*, *C. floccosus*, *C. parkeri*, *C. parkeri* var. *jammuensis*, *Gymnanthelia commutata*, *Sorghum commutatum*

oblasti: Arabský poloostrov, Balúčistán, Indie, Irák, Írán, Mauretánie, Sindh, Somálsko, Tanzánie

Roste v Mauretánii, na východ po Somálsko a Tanzánii, dále na Arabském poloostrově, Iráku, Indii a Pakistánu jako trvalka. Dorůstá výšky 0,15 - 1,5m. Stonky jsou vzpřímené až vystoupavé. Listy jsou zelené až načervenalé, dlouhé 10 - 50cm, široké 1 - 4mm, na bázi zúžené a pochvaté (pochva ochlupená). Květenstvím je vzpřímený klas délky 5 - 35cm a hrozny jsou dlouhé 1,5 - 4cm.

Cymbopogon densiflorus

synonyma: *Andropogon densiflorus*, *Andropogon schoenanthus* subsp. *densiflorus*, *Andropogon schoenanthus* var. *densiflorus*, *Andropogon stypticus*, *C. giganteus* var. *densiflorus*, *C. schoenanthus* var. *densiflorus*, *C. schoenanthus* var. *stypticus*, *C. stypticus*

Cymbopogon dependens

Cymbopogon dieterlenii

synonyma: *Andropogon dieterlenii*

Cymbopogon distans

synonyma: *Andropogon distans*, *Andropogon nardus* var. *distans*

oblasti: Chajbar Paštúchvá, Himálaj, Paňdžáb (pakistánský), SZ Indie, Yunnan

Roste v Pakistánu, Indii, Himálaji a Číně jako trvalka. Dorůstá výšky do 90cm. Stonky jsou vzpřímené. Listy jsou zelené, dlouhé do 50cm, široké 3mm a na bázi pochvaté. Květenstvím je přerušovaný klas délky 15 - 30cm s hrozny délky 2,5 - 3,5cm.

Cymbopogon exsertus

synonyma: *Andropogon nardus* var. *exsertus*

Cymbopogon flexuosus

synonyma: *Andropogon ampliflorus*, *Andropogon flexuosus*, *Andropogon nardus* subsp. *flexuosus*, *Andropogon nardus* var. *flexuosus*, *C. flexuosus* var. *arunachalis*, *C. flexuosus* var. *assamensis*, *C. flexuosus* var. *sikkimensis*, *C. travancorensis*

oblasti: Indie, Myanmar (Barma), Srí Lanka, Střední Asie, Thajsko

Pochází z Indie, Srí Lanky, Myanmaru a Thajska. Patří mezi trvalky. Používá se v medicíně.

Cymbopogon gidarba

synonyma: *Andropogon gidarba*, *C. gidarba* var. *burmanicus*, *Sorghum gidarba*

Cymbopogon giganteus

synonyma: *Andropogon giganteus*, *C. caesius* subsp. *giganteus*, *C. connatus* var. *benearmatus*, *C. giganteus* var. *inermis*

Cymbopogon globosus

synonyma: *Andropogon moluccanus*

Cymbopogon goeringii

synonyma: *Andropogon goeringii*, *Andropogon nardus* var. *goeringii*, *C. angustispica*, *C. goeringii* var. *viridis*, *C. nardus* var. *goeringii*, *C. nervosus*, *C. tortilis* subsp. *goeringii*, *C. tortilis* var. *goeringii*

Cymbopogon gratus

synonyma: *Andropogon gratus*

Cymbopogon jwarancusa

synonyma: *Andropogon himalayensis*, *Andropogon jwarancusa*, *Sorghum jwarancusa*

oblasti: Florida, Írán, Pákistán

Roste v podobě trvalky. Dorůstá výšky do 1,5m. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý. Listy jsou bělavé, dlouhé do 30cm, široké 5mm, na bázi zúžené a pochvaté. Květenstvím je klas délky 15 - 40cm s hrozny délky 1,3 - 2,2cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *olivieri*/*C. olivieri*

Cymbopogon khasianus

synonyma: *Andropogon khasianus*, *Andropogon nardus* var. *khasianus*, *C. auritus*

Cymbopogon mandalaiaensis

Cymbopogon marginatus

synonyma: *Andropogon marginatus*, *Andropogon nardus* subsp. *marginatus*, *Andropogon nardus* var. *marginatus*

Cymbopogon martini

oblasti: Balúčistán, Chajbar Paštunchwá, Indie, JV Asie, Paňdžáb (pakistánský), Sindh

Roste v Asii, zejména v Indii a Pakistánu jako trvalka. Dorůstá výšky až 3m. Pod zemí vytváří dřevnatý oddenek. Listy jsou úzce kopinaté, tmavězelené, dlouhé do 50cm, široké 1 - 3cm a na bázi srdčité. Květenství je klasnaté, úzce podlouhlé, vzpřímené, dlouhé do 30cm a hrozny jsou dlouhé 1,5 - 2cm. Využívá se z ní olej bohatý na esence.

Cymbopogon mekongensis

Cymbopogon microstachys

synonyma: *Andropogon nardus* var. *microstachys*, *C. flexuosus* var. *microstachys*

Cymbopogon microthecus

synonyma: *Andropogon microtheca*

Cymbopogon minor

Cymbopogon minutiflorus

Cymbopogon nardus

synonyma: *Andropogon citrosus*, *Andropogon confertiflorus*, *Andropogon grandis*, *Andropogon hamulatus*, *Andropogon khasianus*, *Andropogon nardus*, *Andropogon nardus* subsp. *grandis*, *Andropogon nardus* subsp. *nilagiricus*, *Andropogon nardus* var. *confertiflorus*, *Andropogon nardus* var. *luridus*, *Andropogon nardus* var. *prolixus*, *Andropogon nardus* var. *validus*, *Andropogon nilagiricus*, *Andropogon pseudohirtus*, *Andropogon thwaitesii*, *C. afronardus*, *C. claessensii*, *C. confertiflorus*, *C. nardus* subsp. *nilgiricus*, *C. nardus* var. *confertiflorus*, *C. nardus* var. *luridus*, *C. prolixus*, *C. thwaitesii*, *C. validus*, *C. validus* var. *lysocladus*, *C. virgatus*, *Sorghum nardus*

oblasti: JV Asie, Portoriko

Pochází z tropické Asie. Dorůstá výšky až 2m. Báze rostliny je načervenalá. Slouží pro výrobu esenciálních olejů.

Potřebuje dobře propustnou lehkou půdu bohatou na živiny.

Cymbopogon nervatus

synonyma: *Andropogon nervatus*, *Andropogon schoenanthus* subsp. *nervatus*, *Andropogon schoenanthus* var. *nervatus*, *C. nervatus* var. *aerythraeum*, *Gymnanthelia nervata*

Cymbopogon obtectus

oblasti: Austrálie

Pochází z Austrálie.

Cymbopogon osmastonii

Cymbopogon pendulus

synonyma: *Andropogon pendulus*

Cymbopogon polyneuros

synonyma: Andropogon polyneuros

Cymbopogon pospischilii

synonyma: Andropogon nardus var. stenanthus, Andropogon nardus var. stracheyi, Andropogon plurinodis, Andropogon pospischilii, C. plurinodis, C. ramnagarensis, C. stracheyi

oblasti: Chajbar Paštunchwá, Etiopie, Gilgit-Baltistán, Kapsko, Nepál, Paňdžáb (pakistánský), Sindh, Somálsko, Tanzánie, Z Himálaj

Roste v Pakistánu, Nepálu, Himálaji a v Africe od Etiopie a Somálska po JAR jako trvalka. Dorůstá výšky do 1m. Stonek je vzpřímený až vystoupavý. Listy jsou dlouhé 15 - 30cm, široké 1 - 4mm, na bázi zúžené a pochvaté. Květenstvím je klas délky 10 - 30cm s několika hrozny délky 1,2 - 3,5cm a klásky jsou kopinaté a dlouhé 4,5 - 7mm.

Cymbopogon procerus

synonyma: Andropogon exaltatus, Andropogon procerus, C. exaltatus, Sorghum exaltatum, Sorghum procerum

oblasti: Austrálie

Pochází z Austrálie.

Cymbopogon proximus

oblasti: Egypt

Pochází z Egypta.

Cymbopogon pruinus

synonyma: Andropogon pruinus, C. giganteus subsp. madagascariensis

Cymbopogon queenslandicus

Cymbopogon quinhonensis

synonyma: Andropogon quinhonensis

Cymbopogon rectus

synonyma: Andropogon nardus var. rectus, Andropogon rectus, C. javensis, C. nardus f. rectus

Cymbopogon refractus

synonyma: Anatherum refractum, Andropogon refractus, Andropogon refractus var. luxurians, Andropogon tahitensis, Sorghum refractum

oblasti: Austrálie, Havajské ostrovy

Pochází z Austrálie.

Cymbopogon schoenanthus

synonyma: Andropogon circinnatus, Andropogon eriophorus, Andropogon laniger, Andropogon lanigerum, Andropogon mascatensis, Andropogon nardoides, Andropogon schoenanthus, Andropogon schoenanthus var. versicolor, Andropogon versicolor, C. arabicus, C. circinnatus, C. citriodorus, C. schoenanthus subsp. velutinus, C. versicolor, Lagurus schoenanthus, Sorghum schoenanthus, Trachypogon schoenanthus

oblasti: S Afrika, Střední Asie

Pochází z jižní Asie a severní Afriky.

Cymbopogon tortilis

synonyma: Andropogon hamatulus, Andropogon nardus subsp. hamatulus, Andropogon nardus var. tortilis, Anthistiria tortilis, C. hamatulus, C. jinshaensis, C. nardus subsp. hamatulus, C. nardus var. tortilis, C. tortilis

Cymbopogon traninhensis

synonyma: C. confertiflorus var. traninhensis, C. khasianus var. nagensis

Cymbopogon tungmaiensis

synonyma: C. fibrosus

Cymbopogon winterianus

Dorůstá výšky až 2m. Báze rostliny je červená.

Cymbopogon xichangensis

Další informace:

<http://andrea-ohlsson.blog.cz/1002/citronova-trava-citronella-lemon-grass-cymbopogon-citratus>

<http://www.garten.cz/a/cz/2779-cymbopogon-citratus-citronova-trava/>

<https://www.rostliny.net/>