

Cissampelos pareira

čeleď: Menispermaceae

oblasti: Afrika, Čína, Florida, Indie, Jamajka, Jižní Amerika, JV Asie, Kuba, Mexiko, Pákistán, Portoriko

Roste v Africe, střední a Jižní Americe v podobě polodřevité popínavé rostliny. Dorůstá délky až 8m. Kmínky jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčitékulovité až ledvinité, plstnaté, zakulacené až vykrojené, hrotené, dlouhé (2 -) 2,5 - 12 (i 15)cm, široké 2,5 - 7 (i 11,5)cm, báze zakulacená až téměř srdčitá, řapíky jsou dlouhé 0,1 - 0,9 (i 1,3)cm a nasedají až 0,1 - 1,5 (i 1,8)cm od báze čepele. Samčí květenství bývá dlouhé do 5cm, vlastní květy mají kalíšní lístky délky 1,2 - 1,8mm, koruna má průměr 0,5 - 1,3mm, samičí květenství je hroznovité, dlouhé 5 - 10cm, žlutozelené, listeny mají průměr do 1,5cm, kalíšní lístky jsou eliptické až prakticky kulaté, dlouhé 0,8 - 2mm, široké 0,4 - 1,2mm, korunní lístky jsou dlouhé 0,4 - 1,5mm a široké 0,3 - 1,5mm. Plodem je červená až červenooranžová obvejčitá až téměř kulovitá zploštělá peckovice délky 4 - 6mm a šířky 3 - 4 (i 5)mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *hirsuta*/C. *hirsuta*/var. *orbiculata*/C. *convolvulacea* var. *hirsuta* - Čína, tropická Asie, Indie, Afrika; větve slabé, zpravidla hustě ochlupené; listy kulaté (i srdčité), zpravidla vykrojené, hrotené, oboustranně ochlupené, dlouhé i široké 2 - 5 (i 12)cm, báze srdčitá nebo uťatá (i zakulacená), dlanitě 5 - 7mižilné a řapíky zpravidla ochlupené, kratší čepele; samčí květenství úžlabní, ochlupené, vlastní květy mají kalíšní lístky délky 1,2 - 1,5mm, koruna pohárkovitá, samičí květenství úzké, kyticovité, dlouhé do 18cm, listeny prakticky kulaté, překrývající se, hustě ochlupené, vlastní květy mají kalíšní lístky široce obvejčité, velikosti 1,5mm, korunní lístky drobné, velikosti 0,7mm; plody ochlupené, široce obvejčité, velikosti 3 - 5mm
- var. *pareira*

<https://www.rostliny.net/>