

Citharexylum (Houselník)

čeleď: Verbenaceae

Roste od jihu USA po Argentinu v podobě stálezeleného nebo poloopadavého stromu či keře a může být i trnitý. Větve bývají v mládí 4hranné. Listy jsou vstřícné nebo střídavé, lesklé a zpravidla na bázi se 2mi žlázami. Květenstvím je vrcholová nebo úžlabní lata, klas nebo hrozen, vlastní květy jsou malé, bílé nebo žluté, stopky mají podepřené listeny, kalich je úzce zvonkovitý až mírně trubkovitý s drobnými 5ti laloky, koruna řepicovitá, okraj mírně zkosený, 4 - 6tilaločný a trubka je válcovitá. Plodem je bobulovitá dužnatá peckovice.

Vyhovuje mu plné slunce s dobře propustnou půdou bohatou na živiny a dostatkem vody.

Množí se semeny nebo řízkami.

Citharexylum affine

oblasti: Belize, Guatemala, J Mexiko, Nikaragua, S Mexiko

Roste od Mexika po Nikaraguu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 30m při průměru kmene do 40cm. Borka bývá drsná, hnědá a šupinovitá. Větve jsou v mládí tlusté, ostře 4hranné až křídlaté a vrcholové větve bývají zploštělé. Listy jsou eliptické až mírně vejčité nebo kopinaté, špičaté, dlouhé 6 - 29cm, široké 3 - 14cm, báze zpravidla klínovitá (i prakticky zakulacená) a řapíky jsou dlouhé 1 - 8cm. Květenstvím je zpravidla větvený hrozen, listeny šídlovitě 3úhlé, krátké, vlastní květy mají 2mm stopku, kalich trubkovitě zvonkovitý, prakticky uťatý, řídce zubatý, dlouhý 3 - 4mm (za plodu až 6mm), koruna je světle růžovofialová s tmavšími proužky, trubka má délku 5 - 6mm a laloky jsou dlouhé 4 - 5mm. Plody jsou žluté, později černé, vejčitékulovité a dlouhé 8mm.

Citharexylum alainii

oblasti: Dominikánská Republika

Roste v Dominikánské Republice.

Citharexylum albicaule

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Citharexylum altamiranum

oblasti: SV Mexiko

Roste v Mexiku.

Citharexylum ambiguum

Citharexylum andinum

oblasti: Bolívie, Jujuy, Peru

Roste v Bolívii, Peru a Argentině. Větve jsou v mládí 4hranné a mají úzké trny délky 0,6 - 1,6cm. Listy jsou podlouhlé až eliptické, zakulacené i mírně vykrojené, dlouhé 1 - 3cm, široké 0,5 - 1,3cm, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Květenstvím je 2 - 4květý hrozen délky do 1cm na 1 - 4mm stopce, vlastní květy mají 1 - 3mm stopku, kalich ochlupený, dlouhý 3,3 (za plodu až 5)mm, nápadně 5tižebřý, koruna má trubku délky 3,6mm, laloky podlouhlé, zakulacené a dlouhé 2mm. Plodem jsou prakticky kulaté bobule o průměru 8mm.

Citharexylum argutedentatum

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě keře. Větve jsou úponkovité. Listy jsou vstřícné, široce eliptické, kožovité, oboustranně lesklé, dlouhé 1,2 - 1,9cm, široké 0,9 - 1,8cm, báze protáhlá v řapík délky 1 - 2mm, žilnatinu tvoří 3 - 4 sekundární žilky a spodní strana je žláznatě tečkovaná. Květenstvím je max. 3květý hrozen, vlastní květy mají kalich za plodu s délkou i šířkou 3 - 4mm a má 4 - 5 laloků. Plodem jsou prakticky kulaté nebo podlouhlé lesklé černé hroty bobule délky 3 - 4mm.

Citharexylum berlandieri

oblasti: Oaxaca, Peru, San Luis Potosí, Tamaulipas, Texas

Roste v USA a Mexiku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 6 (i 9)m. Větve jsou šedé, pruhované a v mládí ochlupené. Listy jsou obvejčité, vejčité nebo kosočtvercovité, občas drobně zubaté, řídce ochlupené a dlouhé do 7cm. Květenství je klasovité, dlouhé do 10cm, vlastní květy mají bílou korunu velikosti do 3mm, laloky kulaté a řídce ochlupené.

Citharexylum bourgeauanum

oblasti: Oaxaca, Veracruz

Roste v Mexiku.

Citharexylum brachyanthum

oblasti: Coahuila, Nuevo León, Texas

Roste v USA a Mexiku.

Citharexylum bullatum

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii.

Citharexylum calvum

oblasti: Quintana Roo

Roste v Mexiku.

Citharexylum caudatum

oblasti: Havajské ostrovy, Hispaniola, J Mexiko, Kolumbie, Kuba, Peru, Portoriko

Roste ve střední Americe včetně Karibiku, Kolumbii a Peru v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 20m. Větve jsou prakticky kulaté, slabé a v mládí až 4hranné. Listy jsou eliptické, zpravidla tupé, lesklé, mohou být kožovité, dlouhé 5 - 17cm, široké 1,5 - 5,5cm, báze zúžená, špičatá, po stranách žláznatá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Květenstvím je podlouhlý hrozen délky 3 - 40cm, který může být umístěn i v latě, vlastní květy mají 1,5 - 3mm stopku, kalich zvonkovitý, prakticky uťatý, dlouhý 3 - 4mm, tupě 5tízubý, koruna je bílá, trubka 2x delší kalicha, okraj je rozložený a široký 4 - 5mm. Plodem je kulovitá až vejčitá peckovice v barvě oranžové až červené, později černé, lesklé, 2 - 3x delší kalicha, délky 0,6 - 1,2cm a šířky 0,5 - 1cm.

Citharexylum chartaceum

oblasti: Ekvádor, Peru

Roste v Peru a Ekvádoru. Větve jsou v mládí ostře 4hranné. Listy jsou eliptické až téměř vejčité, špičaté, dlouhé 5 - 16cm, široké 3 - 7,2cm, báze špičatá nebo zašpičatělá s 1 - 2mi drobnými žláznami, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 8 sekundárních žilek a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1,3cm. Květenstvím je vrcholový nebo úžlabní hrozen, zpravidla převislý, dlouhý 9 - 18cm, mají 1,5 - 3cm stopku, listence bývají 2, čárkovité, dlouhé do 4mm, vlastní květy mají max. 1mm stopku, kalich průsvitný, dlouhý 3mm, široký 2,8mm, drobně 5tízubý, koruna má trubku velikosti 4,4mm, uvnitř ochlupenou, laloky mírně obvejčité, uvnitř ochlupené, dlouhé 3,2mm a široké 2,3mm.

Citharexylum cooperi

oblasti: Guatemala, Kostarika, Panama

Roste v Kostarice, Panamě a Guatemale v podobě stromu. Dorůstá výšky 7 - 8m. Větve jsou v mládí 4hranné a mohou být ochlupené. Listy jsou vejčité až eliptické, zašpičatělé, téměř kožovité, dlouhé 6 - 14cm, báze špičatá nebo sbíhavá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,5cm. Květenství je latnaté, tvořené hustými hrozny délky 2 - 10cm, listeny šídlovité, min. délky stopek květů, kalich je úzce zvonkovitý, dlouhý 3 - 4mm, má 5 žeber s 5ti vejčitými laloky, koruna má trubku délky 2,5mm a oboustranně drobně ochlupené laloky. Plody jsou prakticky kulaté a dlouhé 6 - 7mm.

Citharexylum costaricense

oblasti: Honduras, Kostarika, Nikaragua

Roste v Kostarice, Nikarague a Hondurasu.

Citharexylum crassifolium

oblasti: Belize, Chiapas, Guatemala, Honduras

Roste v Mexiku, Belize, Guatemale a Hondurasu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 9m. Větve mohou být v mládí 4hranné a zpravidla ochlupené. Listy jsou podlouhlé, eliptické nebo obvejčité, tuhé, kožovité, občas na vrcholku hrubě pilovité, zašpičatělé až tupé, dlouhé 5 - 15cm, široké 2 - 8cm, báze špičatá až zakulacená, sbíhavá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Květenstvím je zpravidla chudý hrozen délky 5 - 15cm, listeny jsou drobné, vlastní květy mají 1 - 3mm stopku, kalich úzce zvonkovitý, dlouhý 2 - 3mm, má 5 krátkých zubů, za plodu je mělce široce pohárkovitý, uťatý, koruna je bílá, trubka dlouhá 3 - 4mm, laloky jsou oboustranně ochlupené a velikosti 1,5 - 2mm. Plodem je obvejčité kulovitá žlutá, později černá bobule velikosti 7 - 8mm.

Citharexylum danirae

oblasti: Revillagigedo

Roste na mexickém souostroví Revillagigedo.

Citharexylum decorum

oblasti: Kolumbie, Venezuela

Roste v Kolumbii a Venezuele.

Citharexylum dentatum (Houselník zubatý)

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě bohatě větveného keře až stromu. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou v mládí prakticky 4hranné a ochlupené. Listy jsou husté, mírně obvejčité až eliptické, tupě zakulacené až špičaté, tuhé, kožovité, podvinuté, oboustranně tečkované, mírně drsné, lesklé, dlouhé 2,5 - 3cm, široké 0,7 - 1,9cm, báze protáhlá, spodní strana světlejší, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,1 - 1cm. Květenstvím je hrozen délky 1 - 3,5cm, listeny štětinovité nebo čárkovité, dlouhé do 3mm, vlastní květy mají za plodu až 4,5mm stopku, kalich s 5 - 7mi žilkami, 5 - 7mi zuby délky 4 - 5mm, koruna je holá, pouze jícen ochlupený. Plody jsou lesklé a dlouhé 1cm.

Citharexylum discolor

oblasti: Hispaniola, Kuba

Roste na Kubě a Hispaniole.

Citharexylum donnell-smithii

oblasti: Chiapas, Guatemala, Honduras, Kostarika, Oaxaca, Panama, Salvador

Roste v Mexiku a střední Americe v podobě stromu. Dorůstá výšky do 15m při průměru kmene do 70cm. Větve jsou v mládí prakticky kulaté. Listy jsou kopinaté, zašpičatělé, kožovité, lesklé, dlouhé 8 - 20cm, široké 2 - 5,5cm, báze špičatá a řapíky jsou dlouhé 1 - 3cm. Květenstvím je hrozen délky 5 - 35cm, zpravidla seskupený v latě, listeny jsou malé, šídlovité, vlastní květy mají 1 - 3mm stopku, kalich trubkovitě zvonkovitý délky 2 - 3,5cm, má 5 zubů a 5 žeber, za plodu je pohárkovitý, koruna je zelenobílá až béžová, trubka dlouhá 4mm a má 1 - 2mm uvnitř ochlupené laloky. Plody jsou eliptické, žlutooranžové až červené, později černé a dlouhé 6 - 7mm.

Citharexylum dryanderæ

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, Peru, Venezuela

Roste v Kolumbii, Venezuele, Peru a Ekvádoru.

Citharexylum ekmanii

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Citharexylum ellipticum

oblasti: Campeché, Kuba, Tabasco, Veracruz

Roste v Mexiku, zavlečen byl na Kubu a Kajmanské ostrovy.

Citharexylum endlichii

oblasti: SV Mexiko

Roste v Mexiku.

Citharexylum flabellifolium

oblasti: Kalifornský záliv, Sonora

Roste v Mexiku.

Citharexylum flexuosum (Houselník ohebný)

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Bolívii a Peru. Větve jsou v mládí 4hranné a přetvářejí se v trny. Má až 5cm dlouhé trny.

Listy jsou podlouhlé až prakticky eliptické (i obvejčité), tupé nebo vykrojené, drobně hrotité, lesklé, dlouhé 2 - 6cm, široké 1 - 3mm, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,5cm. Květenstvím je chudý vrcholový nebo úžlabní hrozen, vlastní květy mají 1mm stopku, kalich zvonkovitý délky do 4mm (za plodu 2,5 - 3mm, šířky 4 - 7mm), má 5 tupých zubů prakticky délky korunní trubky a koruna má trubku se zakulacenými ochlupenými laloky. Plody jsou růžovofialovočerné nebo černé a velikosti 8mm.

Citharexylum fulgidum

oblasti: SV Mexiko, Veracruz

Roste v Mexiku.

Citharexylum gentryi

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

Citharexylum glabrum

oblasti: Oaxaca

Roste v Mexiku.

Citharexylum glaziovii

oblasti: V Brazílie

Roste v Brazílii.

Citharexylum grandiflorum

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

Citharexylum guatemalense

oblasti: Guatemala, Nikaragua

Roste v Guatemale a Nikarague v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4 - 5m. Větvě jsou v mládí 4hranné. Listy jsou podlouhlé až mírně vejčité, zašpičatělé, dlouhé 10 - 20cm, široké 4 - 8cm, spodní strana je ochlupená a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je hrozen délky 10 - 18cm, listeny jsou malé, vlastní květy mají 2mm stopku, řídce ochlupený kalich délky 5 - 7mm s 5ti laloky délky 1mm, koruna je bílá, vně prakticky holá, trubka má délku 4 - 5mm a laloky jsou dlouhé 2mm. Plody jsou obvejčitě kulovité, oranžové a později černé.

Citharexylum herrerae

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě stromu. Dorůstá výšky 3 - 5m. Větve jsou v mládí ostře 4hranné až křídlaté, trnité, zelené a mírně ochlupené a trny bývají větvené. Listy jsou elipticky kopinaté, zakulacené až špičaté, drobně hrotené, v první 1/2 mohou být pilovité, dlouhé 1 - 2,5cm, široké 3 - 9mm, spodní strana tečkovaná, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a báze je sbíhavá v řapík délky 1 - 4mm. Květenstvím je úžlabní hrozen délky do 2,5 (za plodu až 4)cm, vlastní květy mají až 1mm stopku, kalich délky 3,5 (za plodu až 6)mm s krátkými 5ti zuby, může být laločnatý, koruna má délku 5mm a laloky délky 1mm. Plody jsou dlouze kulovité, lesklé, červené, dlouhé 1,1cm a široké 8mm.

Citharexylum hexangulare

oblasti: Belize, Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua, S Mexiko

Roste od Mexika po Kostariku v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky do 12m při průměru kmene do 15cm. Větve jsou v mládí zpravidla 4 - 6tihranné. Listy jsou vstřícné (i v 3četných přeslenech), kopinaté (i eliptické), špičaté, dlouhé 4 - 16cm, široké 1 - 5,5cm, mívají 2 žlázy na spodní straně báze, spodní strana je drobně ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholový hrozen, může být i v latě, bývají dlouhé 5 - 30cm, bohaté, listeny šídlovité, i delší stopek květů, vlastní květy mají 1mm stopku, kalich trubkovitě zvonkovitý délky 3 - 4mm s 5ti zuby, prakticky holý, koruna je bílá, má 3 - 4mm trubku a drobně ochlupené laloky délky 1 - 2mm. Plody jsou vejčité, žluté, později černé a dlouhé 6 - 8mm.

Citharexylum hidalgense

oblasti: Hidalgo

Roste v Mexiku.

Citharexylum hintonii

oblasti: México

Roste v Mexiku.

Citharexylum hirtellum

oblasti: Belize, Panama, Veracruz

Roste od Mexika po Panamu v podobě keře nebo stromu. Větve jsou v mládí ostře 4hranné a ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté (i tupé), v mládí drobně ochlupené, zprvu papírovité, později téměř kožovité, dlouhé 4 - 12cm, široké 3 - 6cm, báze špičatá, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek, spodní strana drobně ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,5cm. Květenstvím je stopkatý i převislý bohatý hrozen délky 4 - 14cm, listeny jsou úzce šídlovité, dlouhé 1 - 2mm (spodní až 5mm), vlastní květy mají 2 typy, kalich trubkovitě zvonkovitý, dlouhý 4mm nebo 4,5 - 7mm, za plodu zvonkovitý délky 4 -

7mm, koruna je bílá, dlouhá 6mm nebo 7 - 8mm, trubka uvnitř ochlupená a laloky jsou vně drobně ochlupené. Plody jsou vejčité, červené, později černé a dlouhé 0,8 - 1cm.

Citharexylum ilicifolium

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Peru

Roste v Bolívii, Peru a Ekvádoru. Listy jsou eliptické, tupé, mohou být trnitě zubaté, lesklé, prakticky kožovité, dlouhé 2 - 7cm, široké 1 - 4cm a žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek. Květy mají ochlupený kalich s drobnými 5ti zuby a 5ti žilkami, za plodu pohárkovitý, dlouhý 3mm, široký 6mm, koruna má trubku bílou, laloky a jícen ochlupený. Plody jsou černé až růžovofialovočerné velikosti 6mm.

Citharexylum iltisii

oblasti: Peru

Roste v Peru.

Citharexylum integerrimum

Citharexylum joergensenii

oblasti: Argentina, Bolívie

Roste v Argentině a Bolívii.

Citharexylum karstenii

oblasti: Kolumbie, Venezuela

Roste v Kolumbii a Venezuele.

Citharexylum kerberi

oblasti: Veracruz

Roste v Mexiku.

Citharexylum kobuskianum

oblasti: Peru

Roste v Peru. Větvě jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, krátce hrotité, dlouhé 2,5 - 5cm, široké 1,5 - 2,2cm, báze špičatá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenství je úžlabní, hroznovité, dlouhé do 7cm a ochlupené a vlastní květy mají za plodu délku do 3mm. Plody jsou dužnaté, dlouhé 5mm a široké 4mm.

Citharexylum krukovii

oblasti: V Brazílie

Roste v Brazílii.

Citharexylum kunthianum

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, Venezuela

Roste v Kolumbii, Venezuele a Ekvádoru.

Citharexylum laetum

oblasti: J Brazílie

Roste v Brazílii.

Citharexylum laurifolium (Houselník vavřínolistý)

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Peru a Bolívii v podobě keře. Dorůstá výšky 1m. Větve jsou mírně 4hranné. Listy jsou kopinaté, špičaté, mohou být drobně pilovité, kožovité, oboustranně lesklé, dlouhé 5 - 13cm, široké 3 - 6cm a žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek. Květenstvím je vrcholový vzpřímený tuhý bohatý hrozen délky i více než 20cm, vlastní květy jsou prakticky přisedlé, kalich je za plodu asymetricky 2 i vícelaločný, dlouhý do 6mm a široký 7mm. Plody jsou vejčité, dlouhé 8mm a široké 5mm.

Citharexylum lemsii

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice.

Citharexylum ligustrifolium

oblasti: Bolívie, Mexiko

Roste v Mexiku a Bolívii v podobě stálezeleného keře. Kmínky jsou narůžovofialovělé. Listy jsou kopinaté, kožovité a tmavězelené. Květenství je klasovité, převislé, vlastní květy jsou malé, aromatické a růžovofialové.

Citharexylum ligustrinum

Citharexylum lojense

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

Citharexylum lucidum

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku.

Citharexylum lycioides

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku.

Citharexylum macradenium

oblasti: Kostarika, Panama

Roste v Panamě a Kostarice.

Citharexylum macrochlamys

oblasti: Kolumbie, Panama

Roste v Panamě a Kolumbii.

Citharexylum macrophyllum

oblasti: Ekvádor, Francouzská Guyana, Guyana, Kolumbie, SZ Brazílie, Venezuela

Roste v Kolumbii, Venezuele, Ekvádoru, Francouzské Guyaně, Guyaně a Brazílii.

Citharexylum matheanum

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Citharexylum matudae

oblasti: Chiapas

Roste v Mexiku.

Citharexylum mendocinum

Citharexylum mexicanum

oblasti: Oaxaca, Puebla, Veracruz

Roste v Mexiku.

Citharexylum microphyllum

oblasti: Hispaniola

Roste na Hispaniole.

Citharexylum mirifolium

oblasti: Kolumbie, Venezuela

Roste v Kolumbii a Venezuele.

Citharexylum mocinoi

oblasti: Guatemala, Honduras, J Mexiko, Kostarika, Nikaragua, Salvador

Roste v Mexiku a střední Americe v podobě stromu. Dorůstá výšky do 18m při průměru kmene do 60cm. Větve bývají zpravidla silné, 4hranné a v mládí plstnaté. Listy jsou tlusté, prakticky kožovité, vejčité až eliptické nebo kopinaté, špičaté (i tupé), vzácně na vrcholu hrubě zubaté, dlouhé 6 - 30cm, široké 3 - 15cm, báze zakulacená, špičatá nebo klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 6cm. Květenstvím je hrozen, občas v latě, může být převislý, plstnatý, bohatý, dlouhý 6 - 30cm, listeny šídlovité, dlouhé do 3mm, vlastní květy mají krátké a tlusté stopky, kalich trubkovitě zvonkovitý, za plodu průměru až 7mm, dlouhý 2,5 - 4mm s 5ti nenavazujícími zuby, koruna je aromatická, bílá, dlouhá do 7mm a trubka je uvnitř ochlupená. Plody jsou prakticky kulaté, později vejčité, lesklé, oranžové nebo červené a nakonec černé. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. longibracteolatum - listeny šídlovité nebo lopatkovité, dlouhé 0,4 - 2,5cm

Citharexylum montanum

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Roste v Kolumbii a Ekvádoru.

Citharexylum montevidense

oblasti: Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay

Roste v Brazílii, Argentině, Paraguayi a Uruguayi.

Citharexylum mucronatum

Citharexylum myrianthum

oblasti: Argentina, Brazílie, Paraguay

Roste v Brazílii, Argentině a Paraguayi.

Citharexylum obtusifolium

oblasti: Espírito Santo

Roste v Brazílii.

Citharexylum oleinum

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku.

Citharexylum ovatifolium

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku.

Citharexylum pachyphyllum

oblasti: Peru

Roste v Peru. Větve jsou silné, tupě 4hranné, v mládí drobně ochlupené, zpravidla bradavičnaté a bohatě olistěné. Listy jsou podlouhlé až eliptické, zakulacené s hrotem, kožovité, mohou být řídce drobně zubaté, oboustranně lesklé, dlouhé 1,5 - 2,5cm, široké 0,7 - 1,5cm, báze prakticky špičatá, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je hrozen délky 1 - 1,5cm, vlastní květy mají až 1mm stopku, kalich obkuželovitý, drobně 5tízubý, délky do 4mm, šířky 7mm, koruna má trubku délky 4,3mm, vnitřní strana jícnu plstnatá a má 4 - 5 laloků délky 1 - 3mm.

Citharexylum pernambucense

oblasti: V Brazílie

Roste v Brazílii.

Citharexylum poeppigii

oblasti: Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Kolumbie, Peru, Venezuela

Roste v Bolívii, Brazílii, Ekvádoru, Kolumbii, Peru a Venezuele. Větve jsou prakticky kulaté a mohou být ochlupené. Listy jsou vstřícné nebo v 3četných přeslenech, mírně vejčité, zašpičatělé, mohou být téměř kožovité, mírně lesklé, dlouhé 20cm, žilnatinu tvoří 9 - 14 párů žilek a báze je sbíhavá v řapík délky 3 - 4cm. Květenstvím je vrcholový hrozen nebo lata délky do 15cm, vlastní květy jsou dlouhé do 1,8cm, kalich obkružellovitý, ochlupený, tupě zubatý, dlouhý 3mm a koruna má 6mm trubku. Plodem je vejčité podlouhlá peckovice. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. margaritaceum - liste mírně vejčité (i podlouhlé), dlouhé 20 - 25cm, široké 7 - 9cm, spodní strana hustě ochlupeně šupinovitá, žilnatinu tvoří 12 - 15 párů žilek a řapíky jsou dlouhé do 2,5cm; hrozny dlouhé do 45cm, stopky dlouhé do 7cm, vlastní květy mají korunu délky do 7mm

Citharexylum punctatum (Houselník tečkovaný)

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Peru a Bolívii. Koncové větve jsou prakticky 4hranné a ochlupené. Listy jsou eliptické až mírně vejčité, zašpičatělé až mírně hrodité, lesklé, prakticky kožovité, tečkované, dlouhé 1 - 2,5cm, široké 0,5 - 1,2cm, báze sbíhavá a žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek. Květenstvím je hrozen délky do 1,5cm, vlastní květy mají kalich drobně ochlupený vykrajovaně 5tízubý trubkovitě zvonkovitý délky 3 - 4mm, za plodu má 5 hlubokých laloků délky 4mm, koruna má délku 5 - 6mm a laloky délky 2mm. Plodem je dužnatá lesklá černá nebo narůžovofialovělá peckovice délky 1 - 1,2cm.

Citharexylum quercifolium (Houselník dubolistý)

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě šplhavé rostliny. Větve jsou prakticky kulaté. Listy jsou mírně eliptické, tupé nebo krátce zašpičatělé, zubaté, prakticky kožovité, mírně lesklé, dlouhé 3 - 8cm, široké 2 - 4cm, báze sbíhavá a žilnatina je síťnatá. Květenstvím je vzpřímený prakticky jednostranný hrozen, vlastní květy mají zvonkovitý kalich s 5ti zuby, koruna je aromatická, bílá a dlouhá 8mm.

Citharexylum quitense

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

Citharexylum racemosum

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku.

Citharexylum recurvatum

Citharexylum reticulatum (Houselník síťkovaný)

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, Peru

Roste v Ekvádoru, Kolumbii a Peru. Větve jsou v mládí 4hranné. Listy jsou křížmostojné, obvejčité až podlouhlé, tupé, zašpičatělé nebo tupé, vzácně trnitě zubaté, kožovité, dlouhé 5cm, široké 1,6 - 2,4cm, báze protáhlá, spodní strana síťnatě žilkovaná a v mládí na žilkách ochlupená. Květenstvím je vzpřímený drobně ochlupený vrcholový hrozen délky do 4cm, vlastní květy mají drobně zubatý kalich s 5ti žilkami, koruna je bílá, drobně ochlupená a v jícnu huňatá. Plodem je černá kulovitá peckovice.

Citharexylum rigidum

oblasti: J Brazílie, Paraguay

Roste v Paraguayi a Brazílii.

Citharexylum rimbachii

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

Citharexylum rosei

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku.

Citharexylum roxanae

oblasti: Kalifornský záliv

Roste v Mexiku.

Citharexylum scabrum

oblasti: S Mexiko

Roste v Mexiku.

Citharexylum schottii

oblasti: J Mexiko, Střední Amerika

Citharexylum schulzii

oblasti: Hispaniola

Roste na Hispaniole.

Citharexylum sessaei

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku.

Citharexylum shrevei

oblasti: Sonora

Roste v Mexiku.

Citharexylum solanaceum

oblasti: J Brazílie

Roste v Brazílii.

Citharexylum spinosum

oblasti: Florida, Francouzská Guyana, Guyana, Havajské ostrovy, Indie, Melanésie, Mosambik, Pákistán, Panama, Portoriko, Venezuela

Roste v Karibiku, Panamě, Venezuele, Francouzské Guayaně, Guayaně, v podobě poloopadavého stromu či keře a zavlečen byl do Indie, Mosambiku, Fidži a Bermud. Dorůstá výšky do 12 - 15m. Listy jsou eliptické až vejčité nebo kopinaté, tmavězelené, dlouhé (4 -) 7 - 16 (i 30)cm, široké 3,5 - 8cm, spodní strana je světlejší, řapíky jsou oranžové a dlouhé 2 - 2,5cm. Květenstvím je hrozen nebo lata délky (10 -) 20 (i 40)cm a vlastní květy jsou malé a bílé nebo béžové, prakticky přisedlé, průměru 5 - 6mm, kalich má trubku délky 3mm s 5ti zuby, koruna má délku do 8mm, trubku délky 5mm a jícen je hustě ochlupený. Plody jsou červené až černé bobule průměru 0,7 - 1cm.

Citharexylum standleyi

Citharexylum stenophyllum

oblasti: Haiti

Roste na Haiti.

Citharexylum steyermarkii

oblasti: Chiapas, Guatemala, Veracruz

Roste v Mexiku a Guatemale v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 8m. Větve jsou 4hranné až téměř kulaté, lesklé a v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, zašpičatělé nebo špičaté, dlouhé 6 - 18cm, široké 3 - 8cm, báze špičatá, spodní strana může být ochlupená, žilnatinu tvoří 7 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Květenstvím je hrozen délky 6 - 18cm, listeny jsou drobné, vlastní květy mají 1 - 3mm stopku, kalich zvonkovitý, uťatý, drobně ochlupený, délky 3mm, za plodu pohárkovitý, lesklý, koruna je bílá, trubka dlouhá 3 - 4mm, laloky jsou dlouhé 2mm a oboustranně ochlupené. Plody jsou oranžové, později černé a dlouhé i více než 8mm.

Citharexylum suberosum

oblasti: Kuba, Peru

Roste na Kubě a v Peru. Větve jsou ostře 4hranné. Listy jsou dlouhé do 13cm, široké 7cm, na bázi řídce žláznaté a žilnatina je síťnatá. Květenstvím je hrozen délky 7 - 20cm, vlastní květy mají kalich za plodu délky do 6mm, šířky 7mm s asymetrickými laloky. Plody jsou lesklé, dlouhé 7mm a široké 6mm.

Citharexylum subflavescens

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, Peru, Venezuela

Roste v Kolumbii, Venezuele, Ekvádoru a Peru.

Citharexylum subthyrsoideum

oblasti: Kolumbie, Venezuela

Roste v Kolumbii a Venezuele.

Citharexylum subtruncatum

oblasti: SZ Brazílie

Roste v Brazílii.

Citharexylum sulcatum

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii.

Citharexylum svensonii

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

Citharexylum teclense

oblasti: Salvador

Roste na Salvadoru.

Citharexylum ternatum

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Citharexylum tetramerum

oblasti: Oaxaca, Puebla

Roste v Mexiku v rezervaci Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Citharexylum tristachyum

oblasti: Jamajka, Kuba

Roste na Kubě, Jamajce a Leewardových ostrovech.

Citharexylum ulei

oblasti: Kolumbie, Peru, SZ Brazílie

Roste v Kolumbii, Peru a Brazílii.

Citharexylum vallense

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii.

Citharexylum venezuelense

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele.

Citharexylum viride

Citharexylum weberbaueri

oblasti: Peru

Roste v Peru. Dorůstá výšky 1m. Větve jsou krátké, porostlé jednoduchými nebo i bohatě větvenými trny. Listy jsou obvejčité, tupé, v mládí ochlupené, nasivělé, dlouhé do 2cm, báze sbíhavá a spodní strana ochlupená. Květenstvím je 3 - 5tikvětý hrozen, vlastní květy mají kalich zvonkovitý, prakticky uťatý, 4zubý, drobně ochlupený, koruna nažloutlá a uvnitř drobně ochlupená.

Citharexylum x jamaicense

oblasti: Haiti, Jamajka, Portoriko

Kříženec C. caudatum x C. spinosum. Roste na Jamajce, Haiti a Portoriku.

Citharexylum x leonis

oblasti: Kuba

Kříženec C. caudatum x C. tristachyum. Roste na Kubě.

Citharexylum x perkinsii

oblasti: Portoriko

Roste na Portoriku.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=208>

<https://www.rostliny.net/>