

Erinus (Nemléč)

čeleď: Plantaginaceae

Roste v jižní a střední Evropě a v severní Africe v podobě poloopadavé trsnaté krátkověké trvalky. Dorůstá výšky do 8cm a šířky více než 10cm. Nejznámějším druhem je E. alpinus.

Vyhovují ji skalní pukliny na plném slunci až polostínu.

Množí se semeny.

Erinus aethiopicus

Erinus africanus

oblasti: Afrika

Roste v Africe.

Erinus alpinus (Nemléč alpský)

oblasti: Alpy, Andalusie, Apeniny, Irsko, Katalánsko, Německo, Pyreneje, S Afrika, Švýcarsko

Roste od Pyrenejí po Apeninský poloostrov a dále i v severní Africe. Patří mezi trvalky rostoucí v trsech. Dorůstá výšky i šířky 5 - 8 (i 25)cm. Střídavé listy mají kopistovitý tvar s vroubkovaným okrajem, zelenou barvu, jsou seskupeny především v přízemní listové růžici, mají délku 0,6 - 1,1 (i 1,4)cm a šířku 2 - 5 (i 7)mm. Kvete růžovofialovými 5tídlými kalichovými květy podobnými floxům v hrozu, kalich má délku 3 - 4mm, koruna je dlouhá 3 - 8mm a široká 3 - 7mm. Plodem je tobolka délky 2,5 - 3mm. Existují ale i kultivary s barvou růžovou nebo bílou, např.:

- 'Albus' - bílé květy
- 'Blau'
- 'Dr. Hahnle'
- 'Mr. Charles Boyle'
- 'Weiss'

Vyhovují mu travnaté suťové svahy. Vyhovuje mu vápencový podklad.

Erinus americanus

Erinus bilabiatus

Erinus campanulata

Erinus capensis

Erinus europaeus

Erinus fragrans

Erinus frutescens

Erinus glabratus

Erinus gracilis

Erinus hispanicus

Erinus humilis

Erinus incisus

Erinus laciniatus

Erinus lanceolatus

Erinus lychnideus

Erinus maritimus

Erinus olivana

Erinus patens

Erinus peruvianus

Erinus portulacaster

Erinus procumbens

Erinus pulchellus

Erinus selaginoides

Erinus simplex

Erinus thiabaudii

Erinus tomentosus

Erinus tristis

Erinus umbellatus

Erinus verticillatus

Erinus villosus

Erinus viscosus

Další informace:

<http://botany.cz/cs/erinus-alpinus/>

<http://www.garten.cz/a/cz/4068-erinus-alpinus-nemlec-alpsky/>

<https://www.rostliny.net/>