

Geocaulon

čeleď: Santalaceae

Existuje pouze 1 druh.

Geocaulon lividum

synonyma: Comandra lividum

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, J Kanada, Kanada, Labrador, Maine, Manitoba, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, New York, Newfoundland, Newfoundland a Labrador, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ontario, Ostrovy prince Edwarda, Quebec, S Kanada, S Severní Amerika, S USA, Saint-Pierre a Miquelon, Saskatchewan, Severní Amerika, Severozápadní Teritorium, Střední Kanada, Střední Severní Amerika, SV USA, SZ Severní Amerika, SZ USA, USA, V Kanada, Vermont, Washington, Wisconsin, Yukon, Z Kanada

Roste na severu Severní Ameriky jako trvalka a poloparazitická bylina či polokeř. Dorůstá výšky 10 - 20 (i 30)cm. Pod zemí vytváří oddenek. Lodyhy mohou vytvářet i trsy a nejsou větvené. Listy jsou střídavé, vejčité, dlouhé 1,5 - 4cm a krátce řapíkaté. Květenstvím je úžlabní vidlan s centrálním květem, postranní zpravidla opadávají, kalich je zvonkovitý, 5tičetný, cípy 3úhlé, dlouhé 1,5mm a koruna chybí. Plodem je kulovitá červená peckovice průměru 0,6 - 1cm.

Vyhovují mu suchá i rašelinná místa.

Další informace:

<https://botany.cz/cs/geocaulon-lividum/>

<http://www.rostliny.net/>