

# Glehnia (Glenie)

čeleď: Apiaceae

Existuje pouze 1 druh.

## Glehnia littoralis

oblasti: Aljaška, Britská Kolumbie, Japonsko, Kalifornie, Korea, Oregon, Přímořský kraj, Sachalin, Tchaj-wan, Washington

Roste na západě Severní Ameriky, v Japonsku, Číně, Koreji a Sachalinu jako trvalka. Lodyha je zakrnělá. Přízemní listy jsou široce vejčité, 1 - 2x 3četné, úkrojky posledního řádu jdou podlouhlé až široce obvejčité, pilovité, tupé nebo zakulacené, mohou být řídce ochlupené, dlouhé 1 - 6cm, široké 0,8 - 3,5cm, spodní strana je plstnatá a řapíky jsou dlouhé. Květenstvím je okolík o průměru 3 - 6cm na 2 - 6cm stopce, tvoří jej 8 - 16 okolíčků na nestejných stopkách, listeny obalíčku jsou čárkovité až kopinaté, kališní cípy kopinaté, dlouhé do 1mm, korunní lístky jsou obvejčité, bílé anebo červené. Plodem je obvejčitá křídlatá ochlupená nažka délky 0,6 - 1,3cm a šířky 0,6 - 1cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. leiocarpa - plody holé

Vyhovují ji pobřežní písčiny a duny.

Další informace:

<https://botany.cz/cs/glehnia-littoralis/>

<https://www.rostliny.net/>