

Alloxylon

čeleď: Proteaceae

Roste v deštných pralesích v podobě strumu. Listy dospělých exemplářů mohou být zpeřené. Květenství je úžlabní nebo vrcholové, hroznovité až chocholičnaté, vlastní květy jsou oboupohlavné, červenooranžové anebo růžové. Plodem je dřevnatý měchýřek.

Alloxylon brachycarpum

oblasti: Melanésie, Papua-Nová Guinea

Roste na Nové Guineji a Molukách v podobě stromu. Dorůstá výšky (17 -) 20 - 40m při průměru kmene do 50cm. Borka je tvrdá, hnědá až šedá a drsná. Větve jsou v mládí na koncích ochlupené. Listy jsou eliptické až mírně obvejčité, kožovité, zakulacené, dlouhé (5 -) 6 - 15 (i 16)cm, široké 2 - 5cm, báze je klínovitá, sbíhavá, žilnatinu tvoří 10 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3cm. Květenství je úžlabní, 2 - 25 (i 30)tkvěté, dřevnaté větveno má tloušťku 2 - 3mm, vlastní květy jsou párovité, mají 2 - 3,5cm stopku, obal růžovočervený, červenooranžový až červený, trubka je dlouhá 2,5 - 5cm, okraj prakticky kulatý a široký 2 - 3mm. Plody jsou podlouhlé nebo eliptické, dlouhé 8 - 14cm, široké 1,5 - 2,5cm, na bázi klínovité, mají 1,5 - 2cm dřevnatou stopku, semena jsou ve 2 řadách po 5 - 7ks, mají délku 3 - 8mm a blanité křídlo.

Alloxylon flammeum

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 33m. Větve jsou na vrcholu plstnaté. Listy na mladých rostlinách jsou zpeřené, tvořené 2 - 9ti laloky, délky až 50cm, na dospělých exemplářích jsou jednoduché, eliptické až mírně obvejčité, tupé až špičaté, dlouhé 8 - 18 (i 25)cm a široké 2 - 4,5cm. Květenství je chocholičnaté, 10 - 52květé ze 2 - 20tičetných svazečků, listeny šídlovité, vlastní květy mají 2,5 - 4,3cm stopku, jsou červenooranžové a korunní lístky dlouhé 3,5 - 5cm. Plodem je dlouze stopkatá tobolka délky 7 - 10cm a obsahuje 8 - 10 semen délky 1cm a šířky 0,8 - 1cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Wickhamii' - vzpřímený habitus s širokou asymetrickou korunou; výška 10 - 15m; listy kožovité, tmavězelené, laločnaté; květenství terminální, červenooranžové

Alloxylon pinnatum

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky (3,5 -) 10 - 18 (i 25)m při průměru kmene 1,5m. Borka je šedohnědá. Listy na dospělých exemplářích bývají zpeřené, občas pod květenstvím jednoduché, lesklé, tmavězelené, dlouhé 10 - 30 (i 50)cm, tvoří je 2 - 11 lístků, vlastní lístky jsou max. krátce řapíčkaté, úzce eliptické, vlastní lístky jsou dlouhé 8 - 15 (i 23)cm a široké 1 - 5cm. Květenství je 50 - 140tkvěté, listeny šídlovité až listovité, vlastní květy jsou růžové až červené, mají 3 - 6cm stopku a korunní lístky jsou dlouhé 3 - 3,8cm.

Alloxylon wickhamii

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii v podobě stromu s přímým kmenem. Dorůstá výšky do 30cm. Listy na dospělých exemplářích jsou střídavé, jednoduché, obkopinaté, mírně obvejčité nebo eliptické, tupé, mírně kožovité, dlouhé 5 - 17 (na mladých exemplářích až 40)cm, široké 1 - 3,5cm a báze je klínovitá. Květenství je chocholičnaté, 4 - 20tkvěté, vyrůstající po 1 - 6ks, mají 1,5 - 4cm stopku, listeny jsou šídlovité až čárkovité, dlouhé 5mm, vlastní květy jsou růžovočervené a korunní lístky dlouhé 2,5 - 4cm. Plodem je měchýřek délky 5,5 - 12cm obsahující křídlatá semena délky 4 - 7cm.

Vyhovují mu tropické deštné lesy.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=951>

<https://botany.cz/cs/alloxylon-wickhamii/>

<https://www.rostliny.net/>