

Imperata cylindrica (Imperáta válcovitá)

synonyma: Imperata arundinacea, Lagurus cylindricus

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Austrálie, Ázád Kašmír, Balúčistán, Chajbar Paštunchwá, Čile, Florida, Georgia, Gilgit-Baltistán, Írán, Itálie, J Afrika, Jižní Karolína, Katalánsko, Louisiana, Mississippi, Oregon, Paňdžáb (pakistánský), Sindh, Středozeemí, Texas, Thajsko, Virginie

Roste v jihovýchodní Asii, Austrálie a jižní Africe jako trvalka v trsech, ale rozšířila se i jinde. Kořeny sahají až 1,2m hluboko. Dorůstá výšky 0,6 - 0,8 (i 3)m. Listy jsou asi 2cm široké, na vrcholu zužují se. Květenstvím je lata délky 5cm ze stříbřitě bílých osinatých klásků. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. africana - Afrika; listy ploché; klásky dlouhé 3 - 5,7mm
- var. cylindrica - středozeemí; listy svinuté
- var. major - tropická Asie a Australasie; listy ploché; klásky dlouhé 2,5 - 4,3cm
- 'Red Baron'/'Rubra' (Krvavá tráva) - výška 30 - 40 (i 50)cm, během léta se list barví ze žlutozelené do červena; mrazuvzdorná -12 až -15°C (údajně i -30°C), středně vlhká půda bohatá na živiny

Vyhovuje ji mírně vlhká výborně propustná půda bohatá na živiny, plné slunce a teplo. Na zimu je nutné trávu zakrýt chvojí, listím, atp.

<https://www.rostliny.net/>