

Burkartia

čeleď: Asteraceae

Existuje pouze 1 druh. Rodové jméno bylo vybráno na počest argentinského botanika jménem Arturo Erhardo Burkat (1906 - 1975).

Burkartia lanigera

synonyma: *Perezia lanigera*, *Perezia sessiliflora*

oblasti: Argentina, Chubut, J Argentina, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Río Negro, Santa Cruz, Střední Argentina

Roste v Argentině v kompaktních polštářových 1/2klatých porostech o průměru až 5cm. Dorůstá výšky (3 -) 5 (i 10)cm. Listy vytvářejí husté růžice, jsou tuhé, čárkovité s hrotem, svinuté, kožovité, dlouhé 0,8 - 1 (i 1,5)cm, široké 1 - 1,5mm a mají ochlupené bazální pochvy. Květenstvím je přisedlý úbor, zákrov je válcovitý, dlouhý 0,7 - 1,1cm, široký 5 - 7mm, zákrovní listeny vyrůstají ve 3 - 4 řadách, jsou kopinaté, špičaté až hrotné, okvětními lístky jsou 4mm, terč tvoří 9 - 12 květů, jsou 2pyské, bílé, vnitřní pysk je krátký, vnější větší, vejčitý, dlouhý až 4mm a je zakončený 3mi drobnými zoubky. Plodem je nažka délky 0,5 - 1cm s bílým chmýrem délky do 6mm.

Vyhovují ji chudé písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Další informace:

<https://botany.cz/cs/burkartia-lanigera/>

<http://www.rostliny.net/>