

Craniotome

čeleď: Lamiaceae

Existuje pouze 1 druh.

Craniotome furcata

oblasti: Bhútán, Himálaj, Kašmír, Laos, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Sichuan, Sikkim, Vietnam, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Indii, Bhútánu, Himálaji, Laosu, Myanmaru, Nepálu a Vietnamu jako trvalka. Dorůstá výšky 0,4 - 1m. Stonek je vzpřímený a v horní části větvený. Listy jsou široce vejčité, zašpičatělé, pilovitě zubaté, řídce ochlupené, dlouhé 5,5 - 10cm, široké 4 - 7cm, báze srdčitá a řapíky jsou dlouhé do 6cm. Květenství má zpravidla 0,4 - 1,5cm stopku, kalich má velikost 1 - 1,5 (za plodu 2 - 2,5)mm s 5ti úzce 3úhlými zuby velikosti 0,5mm, trubka je v hrdle ochlupená, koruna je béžová, později růžová a růžovofialová, velikosti 3 - 4mm, vně ochlupená, horní lalok prakticky chybí, je uťatý, spodní pysk je 3laločný a centrální lalok je největší. Plodem je světlehnědá tvrdka délky 0,7mm a šířky 0,5mm.

<https://www.rostliny.net/>