

Microseris

čeleď: Asteraceae

Roste v Severní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu. Listy vytvářejí přízemní růžici. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka s chmýrem.

Microseris acuminata

oblasti: Kalifornie, Oregon, Sierra Nevada (USA)

Roste v USA jako jednoletka. Dorůstá výšky 5 - 35cm. Listy vytvářejí přízemní růžici a mají délku do 20cm. Květenstvím je úbor na vzpřímené lodyze, vlastní květy mají až 50 okvětních lístků. Plodem je nažka s chmýrem.

Microseris aliciae

Microseris anomala

oblasti: JZ USA

Microseris atrata

Microseris bigelovii

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Roste v Severní Americe jako jednoletka. Dorůstá výšky do 60cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou bohatě laločnaté a dlouhé do 25cm. Květenstvím je úbor na vzpřímené nebo převíslé lodyze a má až 100 žlutých nebo oranžových okvětních lístků. Plodem je nažka s chmýrem.

Microseris borealis

oblasti: Aljaška, Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Microseris breviseta

Microseris callicarpha

Microseris campestris

oblasti: Kalifornie

Roste v USA jako jednoletka. Dorůstá výšky 50cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou bohatě laločnaté a dlouhé do 20cm. Květenstvím je úbor, který obsahuje až 100 bílých nebo žlutých okvětních lístků. Plodem je nažka s chmýrem.

Microseris castanea

Microseris cognata

Microseris conjugens

Microseris decipiens

oblasti: Kalifornie

Microseris douglasii

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste v USA jako jednoletka. Dorůstá výšky 5 - 50cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou zubaté až bohatě laločnaté a dlouhé do 25cm. Květenstvím je úbor s až 200 okvětními lístky v barvě bílé nebo žluté. Plodem je nažka s chmýrem.

Microseris elegans

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste v Kalifornii a Kalifornském zálivu jako jednoletka. Dorůstá výšky do 35cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou zubaté až bohatě laločnaté a dlouhé do 20cm. Květenstvím je úbor tvořený až 100 okvětními lístky v barvě oranžové nebo žluté. Plodem je nažka s chmýrem.

Microseris furfuracea

Microseris heterocarpa

oblasti: Arizona, Kalifornie

Roste v USA jako jednoletka. Listy vytvářejí přízemní růžici. Květenstvím je úbor, který tvoří přes 100 okvětních lístků v odstínech žluté nebo bílé. Plodem je nažka s chmýrem.

Microseris howellii

oblasti: Oregon

Microseris insignis

Microseris intermedia

Microseris laciniata

oblasti: Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington

Roste v USA v podobě trvalka. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou zubaté až laločnaté a dlouhé 10 - 50cm. Květenstvím je úbor tvořený i více než 100 žlutými okvětními lístky. Plodem je nažka s chmýrem.

Microseris lanceolata

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Viktorie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii. Pod zemí vytváří krátký křivý kořen. Listy jsou úzce kopinaté až kopistěvité, mohou být až peřenosečné a dlouhé 10 - 20cm. Květenstvím je úbor o průměru 3 - 5cm a v období poupěte je převislý. Plodem je nažka.

Microseris leiosperma

Microseris leucocarpha

Microseris maritima

Microseris melanocarpha

Microseris neozelandica

Microseris nevadensis

Microseris nutans

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v Severní Americe jako trvalka. Dorůstá výšky do 70cm. Stonek je větvený. Listy jsou zubaté až laločnaté a dlouhé do 30cm. Květenstvím je úbor s až 50ti okvětními lístky. Plodem je nažka s chmýrem.

Microseris obtusata

Microseris oligantha

Microseris paludosa

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě trvalky. Dorůstá výšky do 70cm. Stonek je větvený. Listy jsou zubaté až laločnaté a dlouhé do 35cm. Květenstvím je úbor obsahující až 70 žlutých okvětních lístků. Plodem je bělavá nažka s chmýrem.

Microseris parvula

Microseris picta

Microseris proxima

Microseris pulchella

Microseris pygmaea

Microseris scapigera

oblasti: Austrálie, Nový Zéland

Roste v Austrálii jako trvalka.

Microseris stenocarpha

Microseris sylvatica

oblasti: Kalifornie

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 75cm. Listy jsou zvlněné, zubaté nebo laločnaté a dlouhé do 35cm. Květenstvím je žlutý úbor obsahující až 70 okvětních lístků. Plodem je nažka s chmýrem.

Microseris tasmanica

oblasti: Tasmánie

Microseris teakleana

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii.

Microseris tenuisecta

<https://www.rostliny.net/>