

Crateva religiosa

čeleď: Capparaceae

oblasti: Austrálie, Borneo, Čína, Indie, Jáva, Laos, Malajsie, Myanmar (Barma), Srí Lanka, Sumatra, Thajsko, Tichý oceán

Roste v jihovýchodní Asii, Austrálii, Tichomoří a Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky (2 -) 3 - 20 (i 30)m při průměru kmene 20 - 40cm. Borka je hladká a šedá s bílými skvrnami. Větve jsou v mládí šedohnědé, zelené až žlutozelené. Palisty jsou šídlovité a dlouhé 0,5 - 1mm. Listy jsou 3četně dlanité, vlastní lístky kopinaté, vejčité až obvejčité nebo podlouhlé, zašpičatělé, mohou být mírně kožovité, dlouhé (7 -) 8 - 18 (i 27)cm, široké (2 -) 4 - 8 (i 11)cm, spodní strana bývá světlejší, žilnatinu tvoří 7 - 11 (i 22) párů žilek, postranní lístky jsou dlouhé 8 - 18cm, široké 2 - 8cm, mají max. 0,6 (i 1,3)cm řapíček a řapíky jsou dlouhé (2 -) 3 - 10 (i 22)cm. Květenství je vrcholové, dlouhé do 12cm, (3 -) 20 - 100květé, má 4 - 12cm stopku, vlastní květy jsou 4četné, mají 3 - 7cm stopku, kališní lístky jsou vejčité, dlouhé (2 -) 3,5 - 7mm, široké (1 -) 1,5 - 3mm, korunní lístky jsou bílé, postupně až žlutooranžové, široce vejčité, vejčitě lopatkovité, špičaté až tupé, laloky jsou dlouhé 1,5 - 3cm a široké 1,5 - 2,2cm. Plody jsou eliptické (i kulovité), zelené až žlutošedé, dlouhé 5cm, široké 4cm, obsahují hnědá podkovovitá semena po 25 - 35 (i 50)ks délky 0,5 - 1,7cm.

<https://www.rostliny.net/>