

Beschorneria

čeleď: Asparagaceae

Roste v Mexiku a střední Americe jako sukulent. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou tuhé, mečovité, čárkovité až kopinaté, drsné, na okraji drobně zubaté, šedozelené až modrozelené. Květenstvím je obloukovitý hrozen nebo lata, vlastní květy jsou trubkovité, masité, světlezelené a narůžovělé v červených překrývajících se listenech.

Vyhovuje jim písčité dobře propustná suchá půda na plném slunci a teplo. Na zimu nadzemní část odumírá. Nejsou mrazuvzdorné.

Množí se dělením.

Beschorneria albiflora

oblasti: Chiapas, Guatemala, Honduras, Oaxaca

Roste v Mexiku, Guatemale a Hondurasu.

Beschorneria calcicola

oblasti: Oaxaca, Puebla, Veracruz

Roste v Mexiku.

Beschorneria dubia

oblasti: Tamaulipas

Roste v Mexiku.

Beschorneria rigida

oblasti: Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí

Roste v Mexiku.

Beschorneria septentrionalis

oblasti: Nuevo León, Tamaulipas

Roste v Mexiku.

Beschorneria tubiflora

oblasti: Hidalgo, San Luis Potosí

Roste v Mexiku. Dorůstá výšky do 1m. Listy vytvářejí 10 - 15tičetnou růžici, jsou šedozelené, drsné, dlouhé do 30cm a široké 2,5cm. Květenství je hnědočervené, vlastní květy vyrůstají po 2 - 3ks v paždí vejčitých narůžovofialových listenů, jsou převislé, zelenočervené a dlouhé 2cm.

Beschorneria wrightii

oblasti: México

Roste v Mexiku. Podobá se B. yuccoides, ale listy jsou větší i širší, ostřeji zubaté, na konci a na spodní straně drsné. Květenství má vejčité listeny, vlastní květy jsou zelené až žluté a jemně ochlupené.

Beschorneria yuccoides

oblasti: Hidalgo, Puebla, Veracruz

Roste v Mexiku. Dorůstá výšky (0,6 -) 1 - 1,8 (i 3,2)m. Listy vytvářejí 20 - 35tičetnou růžici, jsou kopinaté, zubaté, kožovité, modrošedé až modrozelené, dlouhé 40 - 60 (i 70)cm, široké 3,3 - 3,5 (i 10)cm a spodní strana je drsná. Květenstvím je načervenalá lata s 8 - 20ti větvemi na červené lodyze, listeny jsou červené, vlastní květy jsou převislé, zelené, trubkovité až úzce nálevkovité a dlouhé 4 - 5 (i 8,5)cm. Plody jsou téměř kulovité, dlouhé 3 - 4cm a široké 1,5 - 2,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. dekosteriana
- subsp. yuccoides

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1623>

<https://www.rostliny.net/>