

Bursaria

čeleď: Pittosporaceae

Roste v Austrálii v podobě stálezeleného zpravidla trnitého keře nebo stromu. Listy jsou střídavé. Květenstvím je vrcholová lata, vlastní květy jsou malé, sladce aromatické a 5tičetné. Plodem je tobolka. Nejznámějším druhem je *B. spinosa*.

Vyhovuje jí plné slunce, teplo a pravidelná zálivka.

Množí se semeny nebo řízky.

Bursaria calcicola

oblasti: Austrálie

Bursaria incana

oblasti: Austrálie

Bursaria longisepala

oblasti: Austrálie

Bursaria occidentalis

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1,2 - 8m. Kvete světleběžovými květy.

Bursaria reevesii

oblasti: Austrálie

Bursaria spinosa

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě stálezeleného zpravidla křivolakého asymetrického keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 8 (i 13)m. Větve min. u mladých exemplářů mají úzké trny délky 1cm. Listy jsou střídavé, čárkovité, mírně vejčité, eliptické nebo obvejčité, mohou být mělce zubaté a dlouhé 0,4 - 5cm. Květenstvím je kuželovitá lata délky i šířky 1 - 12cm, vlastní květy jsou bílé nebo béžové, kališní lístky jsou vejčité nebo 3úhlé, dlouhé 0,5 - 1mm, korunní lístky jsou podlouhlé až mírně obvejčité a dlouhé 3 - 8mm. Plodem je obvejčitá až obsrdčitá růžovočervená, později hnědá tobolka délky 4 - 8mm a obsahuje ledvinitá hnědá semena délky 3 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *australis* - Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Viktorie; keř; listy ve svazečcích, mírně kopinaté, dlouhé 0,6 - 3cm, široké 2 - 4mm; kališní lístky 3úhlé, dlouhé 0,5 - 1mm, korunní lístky čárkovité, dlouhé 5mm a široké 1,5mm
- var. *lanceolata* - Jižní Austrálie; keř; výška zpravidla do 2m; listy kopinaté, dlouhé 2,5 - 7cm, široké 3 - 9mm; kališní lístky opadavé, dlouhé 0,5mm, korunní lístky dlouhé 2,5 - 4mm, široké 1mm, tyčinky jsou delší korunních lístků
- subsp. *lasiophylla* - keř; výška 0,5 - 3m; větve s trny délky 1cm; listy střídavé, úzké, obvejčité, (i mělce zubaté), ztlustlé, dlouhé 0,4 - 3cm, široké 0,2 - 1cm; spodní strana bílá, šedá nebo nažloutlá; květenstvím je úzká až kuželovitá lata délky 3 - 10cm, květy bílé nebo béžové, kališní lístky 3úhlé až vejčité, dlouhé 0,5 - 2mm, korunní lístky úzce obvejčité, dlouhé 3 - 6mm; tobolky obvejčité, hnědé, dlouhé 4 - 7mm, široké 5 - 8mm, obsahují ledvinitá hnědá plochá semena délky 3 - 4mm
- var. *albicoma* - Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Viktorie; výška do 2,5m; větve v mládí plstnaté; listy v 2 - 4četných svazečcích, mírně kopinaté, prakticky podvinuté, dlouhé 0,9 - 3cm, široké 0,5 - 1cm, spodní strana šedě, bíle nebo žlutě ochlupená; květenství vrcholové, hroznovité nebo latnaté, vlastní květy mají 1,5 - 6mm stopku, kališní lístky mírně kopinaté, dlouhé 1 - 2mm, široké 0,5mm, korunní lístky bílé, dlouhé 4 - 6mm a široké 1 - 1,5mm
- var. *atriplicina* - Viktorie, Nový Jižní Wales; výška do 3m; zpravidla s kmínkem; listy obvejčité, dlouhé 1 - 2,5cm; květy mají kališní lístky délky 1 - 2mm
- var. *lasiophylla*/var. *parvifolia* - úzký habitus; výška do 2m; listy obvejčité, dlouhé 0,2 - 1,2cm; kališní lístky dlouhé 0,5 - 1mm

- var. *macrophylla*/var. *luxurians*/var. *pantonii*/B. *pantonii* - Jižní Austrálie, Viktorie, Nový Jižní Wales, Queensland; strom až keř; listy kopinaté, dlouhé 2,5 - 5cm, široké 1 - 1,9cm; kališní lístky opadavé, dlouhé 0,5mm, korunní lístky dlouhé 3,5 - 5,5mm, široké 1 - 1,5mm, tyčinky stejné délky jako korunní lístky
- var. *microphylla* - Jižní Austrálie, Queensland, Nový Jižní Wales; keř; trny delší listů; listy čárkovité až mírně kopinaté, dlouhé 0,4 - 1cm, široké 0,5 - 2,5mm; kališní lístky opadavé, dlouhé do 0,5mm, korunní lístky dlouhé 3 - 5mm, široké 0,5 - 1mm
- var. *obovata* - Jižní Austrálie, Queensland, Viktorie; keř; trny bohaté a dlouhé 0,6 - 1cm; listy řídké, svazčité, obvejčité až kopinaté, dlouhé 0,6 - 1,8cm, široké 3 - 8mm; kališní lístky dlouhé do 0,5mm
- subsp. *spinosa*/var. *spinosa* - Jižní Austrálie, Viktorie, Nový Jižní Wales, Tasmánie; trnitý keř; výška do 2m; listy ve svazečcích, čárkovité až kopinaté, dlouhé 1 - 2,5cm, široké 0,2 - 1cm; kališní lístky opadavé, dlouhé do 0,5mm, korunní lístky dlouhé 3 - 4mm a široké 0,7 - 1mm

Bursaria tenuifolia

oblasti: Austrálie

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1707>

<https://www.rostliny.net/>