

## Moehringia (Mateřka)

čeleď: Caryophyllaceae

Rod byl pojmenován na počest dánského lékaře a botanika P. H. Moehringa (1720 - 1792). Kvete drobnými bílými kvítky.

### Moehringia argenteria

oblasti: Itálie

### Moehringia bavarica

synonyma: *Alsinanthus bavaricus*, *Alsine bavarica*, *Arenaria baldensis*, *Arenaria bavarica*, *Arenaria glaucovirens*, *Arenaria ponae*

oblasti: Itálie

### Moehringia ciliata (Mateřka brvitá)

synonyma: *Alsinanthus obtusus*, *Alsine occulta*, *Alsine polygonoides*, *Arenaria alpina*, *Arenaria obtusa*, *Arenaria occulta*, *Arenaria polygonoides*, *Arenaria sphagnoides*, *M. polygonoides*, *Sabulina polygonoides*, *Stellaria ciliata*, *Stellaria polygonoides*

oblasti: Itálie, Německo

### Moehringia concarenae

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

### Moehringia dielsiana

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

### Moehringia diversifolia

synonyma: *Arenaria diversifolia*

oblasti: Rakousko

Patří mezi endemity Rakouska.

## *Moehringia glaucovirens*

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

## *Moehringia glochidisperma*

### *Moehringia grisebachii*

synonyma: *Arenaria grisebachii*

## *Moehringia hypanica*

### *Moehringia insubrica*

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

### *Moehringia intermedia*

synonyma: *M. muscosa* var. *intermedia*

oblasti: Itálie

## *Moehringia intricata*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 10 - 25 (i 30)cm. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *intricata*
- subsp. *tejedensis*

### *Moehringia jankae*

synonyma: *Arenaria jankae*

## *Moehringia lateriflora*

synonyma: *Alsinanthus lateriflorus*, *Alsine lateriflora*, *Arenaria buxifolia*, *Arenaria haenkeana*, *Arenaria lateriflora*, *Arenaria lateriflora* var. *angustifolia*, *Arenaria lateriflora* var. *tayloriae*, *Arenaria pensylvanica*

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

### **Moehringia lebrunii**

oblasti: Itálie

### **Moehringia macrophylla**

synonyma: *Arenaria macrophylla*

oblasti: Britská Kolumbie, Connecticut, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Labrador, Manitoba, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nové Mexiko, Ontario, Oregon, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Vermont, Washington, Wisconsin

Pochází z východu a západu Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Na vzpřímeném stonku dorůstá max. výšky asi 18cm. Vstřícné listy jsou kopinaté, dlouhé do 5cm. Kvete bílými kvítky s 5ti okvětními lístky. Plodem je zubatá černá tobolka.

Vyhovují ji vlhká stinná místa.

### **Moehringia markgrafii**

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

### **Moehringia minutiflora**

#### **Moehringia muscosa (Mateřka mechovitá)**

synonyma: *Alsine muscosa*

oblasti: Itálie, Katalánsko, Německo, Polsko

Dorůstá výšky 5 - 20cm. Kvete bílými květy.

### **Moehringia papulosa**

synonyma: *Arenaria papulosa*, *Arenaria tomasinii*

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

### **Moehringia pendula**

synonyma: *Arenaria pendula*, *Arenaria radicans*

### **Moehringia pentandra**

synonyma: *Arenaria pentandra*, *M. thasia*, *M. trinervia* subsp. *pentandra*

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko

Dorůstá výšky (5 -) 10 - 25cm.

### **Moehringia pichleri**

### **Moehringia sedoides**

synonyma: *Arenaria dasypylla*, *M. muscosa* var. *sedoides*, *M. sedifolia*

oblasti: Itálie

### **Moehringia tejedensis**

synonyma: *Arenaria tejedensis*, *M. fontqueri*

oblasti: Sierra Nevada (Španělsko)

Dorůstá výšky 6 - 15 (i 20)cm.

### **Moehringia tommasinii**

oblasti: Itálie, Slovensko

Patří mezi endemity Slovenska.

### **Moehringia trinervia (Mateřka trojžilná)**

synonyma: *Alsine trinervia*, *Alsinella trinervis*, *Arenaria breviflora*, *Arenaria nervosa*, *Arenaria petiolata*, *Arenaria plantaginea*, *Arenaria trinervia*, *Stellaria anhweiensis*, *Strophium trinervium*

oblasti: Írán, Irsko, Itálie, Katalánsko, Německo, Ohio, Polsko

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,15 - 0,3 (i 1,5)m na přímé až poléhavé lodyze. Listy mají vejčitý tvar se zašpičatěním. V horní části jsou přisedlé. Kvete bílými kvítky s 5ti (výjimečně 4mi) květními lístky na stopkách se základnou v paždí listů.

Vyhovují ji lesy všeho druhu, vlhké půdy ideálně kyselého pH a stín.

## **Moehringia umbrosa**

### **Moehringia villosa**

synonyma: Alsine villosa, Arenaria villosa

oblasti: Itálie, Slovensko

Patří mezi endemity Slovenska. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. glabrescens - Itálie

## **Moehringia x coronensis**

## **Moehringia x hybrida**

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K417.php>

<http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=565>

<https://www.rostliny.net/>