

Embelia (Embelie)

čeleď: Primulaceae

Roste v tropech a subtropích Afriky, Asie, Madagaskaru, Austrálie a v Tichomoří v podobě liánovitého dvoudomého, jednodomého nebo mnohomanželného keře. Listy jsou střídavé, dvouřadé anebo v nepravých přeslenech. Květenství je hroznovité, latnaté, okolíčnaté nebo chocholíkaté, vlastní květy jsou oboupohlavné nebo jednopohlavné, 4 - 5tičetné a kališní lístky jsou na bázi srostlé. Plodem je peckovice.

Embelia aberrans

Embelia adnata

Embelia angulosa

Embelia angustifolia

Embelia arborea

Embelia arfakensis

Embelia arunachalensis

Embelia australiana

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii.

Vyhovují jí deštné pralesy.

Embelia basankusuensis

Embelia bataanensis

Embelia biflora

Embelia boivinii

Embelia borneensis

Embelia brassii

Embelia buxifolia

Embelia canescens

Embelia carnosisperma

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě keře, později liánovitého. Větve mají průměr 5 - 6mm. Listy jsou eliptické až obkopynaté (i obvejčité), zašpičatělé, kožovité, dlouhé 8 - 14cm, široké 3,5 - 6,3cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 18 - 28 párů žilek, řapíky jsou červeně tečkované a dlouhé 1,7 - 2,8cm. Květenství je hroznovité, vlastní květy 4četné, samčí velikosti 3mm a mají 2 - 2,5mm stopku. Plody jsou prakticky kulaté, dužnaté a průměru 2,7cm.

Embelia caulialata

Embelia clarkei

Embelia clusiifolia

Embelia comorensis

Embelia concinna

Embelia cordata

Embelia coriacea

Embelia corymbifera

Embelia cotinoides

Embelia cuneata

Embelia curvinervia

Embelia cyrtobotrya

Embelia dasythyrsa

Embelia deivanuae

Embelia demissa

Embelia djalonensis

Embelia drupacea

Embelia effusa

Embelia elevativena

Embelia elliptica

Embelia floribunda

oblasti: Bhútán, Čína, Indie, Myanmar (Barma), Nepál

Roste v Číně, Bhútánu, Indii, Myanmaru a Nepálu v podobě šplhavého keře. Větve mají průměr 2 - 3mm. Listy jsou kopinaté až podlouhlé, dlouze zašpičatělé, mírně podvinuté, mohou být kožovité, dlouhé 6 - 17cm, široké 2 - 5cm, báze zakulacená a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,5cm. Květenství je úžlabní (i vrcholové), listeny šídlovité, vlastní květy jsou 5tičetné, zelené nebo žlutozelené, samčí velikosti 2,7 - 3,2mm, samičí 2 - 2,5mm, mají 1,5 - 4mm stopku, korunní lístky kopinaté anebo obkopinaté. Plody jsou kulovité, červené a průměru 4 - 5mm.

Embelia foetida

Embelia frangulifolia

Embelia frondosa

oblasti: Myanmar (Barma), Sikkim, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Myanmaru a Indii v podobě šplhavého keře. Větve jsou plstnaté, v mládí hranaté a široké 5 - 7mm. Listy jsou eliptické, kopinaté nebo obvejčité, špičaté, černě tečkované, dlouhé 7 - 30cm, široké 3 - 9cm, báze prakticky kulatá nebo tupá, žilnatinu tvoří 15 - 25 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3cm. Květenství je hroznovité, dlouhé 2 - 5cm, listeny jsou úzce kopinaté, dlouhé 2 - 3,5mm, vlastní květy jsou žlutozelené, 4 - 5tičetné, samčí velikosti 3,5 - 4mm, samičí 2 - 3mm, mají 1,8 - 6mm stopku, kališní lístky vejčité až podlouhlé, korunní lístky eliptické anebo obvejčité. Plody jsou kulovité, červené a průměru 3 - 4mm.

Embelia fulva

Embelia furculosa

Embelia furfuracea

Embelia gallatlyi

Embelia gardneriana

Embelia gerardii

Embelia gracilentia

Embelia gracilis

Embelia grandifolia

Embelia grayi

Embelia halconensis

Embelia henryi

oblasti: Guangxi, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě šplhavého keře. Větve bývají v mládí žláznatě ochlupené a průměru 1 - 1,5mm. Listy jsou vejčité nebo kopinaté, zašpičatělé až ocasovité, vroubkovaně pilovité, dlouhé 1,5 - 3cm, široké 1 - 3cm, báze zakulacená a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenství je úžlabní, 2 - 9tkvěté, listeny čárkovité, vlastní květy jsou jednopohlavné, 5tičetné, samčí velikosti 1,4 - 2mm, mají 2 - 3mm stopku, kališní lístky mírně vejčité a korunní lístky podlouhlé až vejčité. Plody jsou kulovité, růžovofialové a průměru 3 - 4mm.

Embelia impressa

Embelia incumbens

Embelia javanica

Embelia keniensis

oblasti: Keňa

Roste v Africe v podobě keře nebo popínavky. Dorůstá délky až 10cm. Listy jsou vejčité až eliptické, špičaté nebo zašpičatělé, mírně podvinuté, báze klínovitá (i sbíhavá) a žilnatina je v mládí růžovofialová. Květenstvím je hrozen délky do 4cm a vlastní květy jsou 5tičetné.

Embelia kerrii

Embelia kuborensis

Embelia laeta

oblasti: Čína, Kambodža, Laos, Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Kambodži, Laosu, Thajsku a Vietnamu v podobě šplhavého keře. Větve jsou plstnaté a mají průměr 1,5 - 2mm. Listy jsou obvejčité nebo obkopinaté, špičaté, zakulacené nebo tupé, mohou být podvinuté, dlouhé 1,7 - 7,5cm, široké 0,6 - 3cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 6 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 9mm. Květenství je úžlabní, 3 - 15tikvěté, listeny vejčité, dlouhé 1 - 1,3mm, vlastní květy jsou bílé nebo nažloutlé, 4četné, samičí velikosti 1,5 - 2mm, samčí velikosti 2 - 3mm, mají 1 - 4mm stopku, kališní lístky vejčité až 3úhlé a korunní lístky vejčité nebo podlouhlé. Plody jsou kulaté a průměru 5 - 8mm.

Embelia ledermannii

Embelia legnophylla

Embelia libeniana

Embelia loheri

Embelia longifolia

Embelia luzoniensis

Embelia macrocarpa

Embelia madagascariensis

Embelia micrantha

Embelia microcalyx

Embelia microphylla

Embelia mildbraedii

Embelia minutifolia

Embelia multiflora

Embelia myriantha

Embelia myrtillus

Embelia nigropunctata

Embelia nilotica

Embelia novoguineensis

Embelia nutans

Embelia oblongifolia

Embelia obtusiuscula

Embelia oleifolia

Embelia ottoniana

Embelia ovata

Embelia ovatifolia

Embelia pacifica

Embelia palauensis

Embelia papuana

Embelia parviflora

oblasti: Čína, Indie, Indonésie, Malajsie, Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Indii, Indonésii, Malajsii, Thajsku a Vietnamu v podobě šplhavého keře. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou vejčité, tupé nebo zakulacené, lesklé, na vrcholku řídce červeně tečkované, dlouhé 1 - 2,5cm, široké 0,6 - 1,3cm, báze zakulacená, uťatá nebo srdčitá a řapíky jsou dlouhé do 1mm. Květenství je úžlabní, samčí 1 - 6tikvěté, samičí 2 - 5tikvěté, oboupohlavné 3 - 8mikvěté, listeny jsou dlouhé 0,6 - 1mm, vlastní květy jsou 5tičetné, mají 0,5 - 8mm stopku, bílé nebo nazelenalé, kališní lístky vejčité nebo podlouhlé, korunní lístky vejčité, kopinaté anebo podlouhlé. Plody jsou kulovité, červené a průměru 3 - 5mm.

Embelia pauciflora

oblasti: Guizhou, Sichuan

Roste v Číně v podobě šplhavého dvoudomého keře. Větve jsou v mládí plstnaté a průměru 1 - 2mm. Listy jsou vejčité až úzce kopinaté, zašpičatělé až ocasovité, podvinuté, vroubkovaně pilovité, zuby trnité, dlouhé 3 - 9cm, široké 0,8 - 2cm, báze zakulacená a řapíky jsou dlouhé 2 - 2,6mm. Květenství je úžlabní, 3 - 7mikvěté, listeny kopinaté, vlastní květy jednopohlavné, 5tičetné, samčí velikosti 3 - 3,5mm, samičí 2,5 - 3mm, mají 3 - 5mm stopku, kališní lístky vejčité, korunní podlouhlé anebo kopinaté. Plody jsou kulovité, červené a průměru 5mm.

Embelia penangiana

Embelia pergamacea

Embelia phaeadenia

Embelia philippinensis

Embelia polypodioides

oblasti: Čína, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu v podobě popínavého keře. Větve mají průměr 2 - 3mm. Listy jsou podlouhlé až kopinaté, špičaté, vroubkovaně trnité, lesklé, dlouhé 1,2 - 4,4cm, široké 0,8 - 1,8cm, báze prakticky srdčitá až uťatá, žilnatinu tvoří 12 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenství je úžlabní, okoličnaté, prakticky přisedlé, 1 - 3květé, dlouhé 0,8 - 1cm, listeny jsou růžové, dlouhé 0,8 - 1mm, široké 0,3 - 0,5mm, samčí a oboupohlavné květy velikosti 3 - 4mm, mají 1 - 2,5mm stopku, kališní lístky vejčité, korunní lístky podlouhlé anebo obkopinaté. Plody jsou kulovité, červené, černě a červeně tečkované a průměru 3 - 5mm.

Embelia porteana

Embelia procumbens

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě popínavého keře. Větve jsou kulaté, ochlupené a průměru 1 - 2mm. Listy jsou eliptické, vejčité nebo obvejčité, špičaté nebo tupé, vroubkovaně pilovité s trnitými zuby, dlouhé 1,3 - 3cm, široké 0,5 - 1,7cm, báze klínovitá nebo tupá, žilnatinu tvoří 4 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 5mm. Květenství je úžlabní, 5 - 10tikvěté, listeny čárkovité (i šídlovité), vlastní květy jsou jednopohlavné nebo oboupohlavné, bílé nebo nazelenalé, 5tičetné, samčí velikosti 4 - 5mm, samičí 2,5 - 3mm, oboupohlavné 3 - 3,5mm, mají 3 - 6mm stopku, kališní lístky kopinaté až úzce vejčité, korunní lístky jsou podlouhlé anebo vejčité. Plody jsou kulaté, červené, hustě červeně tečkované a průměru 4 - 5mm.

Embelia pullenii

Embelia pyrifolia

Embelia racemosa

Embelia resinosa

Embelia retata

Embelia reticulata

Embelia ribes

oblasti: Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Nová Guinea, Thajsko, Vietnam

Roste od Indie po jihovýchodní Asii v podobě šplhavého keře. Větve jsou hranaté a plstnaté. Listy jsou eliptické, podlouhlé nebo obvejčité, zašpičatělé, podvinuté, mohou být až kožovité, dlouhé 3,5 - 10cm, široké 1,5 - 3,5cm, báze klínovitá nebo zakulacená a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je vrcholové, listeny šídlovité nebo kopinaté, vlastní květy jsou nazelenalé nebo bílé, 4 - 5tičetné, samčí velikosti 2 - 2,5mm na 2 - 4mm stopce, samičí 1,5 - 2mm na 1,5 - 2,5mm stopce, kališní lístky 3úhlé a korunní eliptické až podlouhlé. Plochy jsou kulaté až vejčité, červené a průměru 2 - 5mm.

Embelia rigida

Embelia rodgeri

Embelia rotundifolia

Embelia rowlandii

Embelia rugosa

Embelia ruminata

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě popínavého keře (i stromu). Dorůstá výšky do 7m. Borka je našedlá. Listy vyrůstají ve spirále, seskupené na koncích větví, jsou obvejčité až podlouhlé, široce zašpičatělé až zakulacené, podvinuté, dužnaté, lesklé, tmavězelené, dlouhé 1 - 5cm, široké 1 - 2,5cm, báze klínovitá a řapíky (občas mírně křídlaté) jsou dlouhé do 1cm. Květenstvím je chudý klas délky do 2,5cm, vlastní květy jsou malé, 4 - 5tičetné a zelené až hnědé. Plodem je tobolka velikosti 7mm.

Embelia sarasinorum

Embelia scandens

oblasti: Guangdong, Hainan, Kambodža, Laos, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Indočíně v podobě šplhavého keře. Větve jsou v mládí ochlupené a průměru 1,5 - 3mm. Listy jsou eliptické až vejčité, zakulacené, občas až téměř kožovité, dlouhé 4 - 12cm, široké 2,5 - 5cm, báze tupá až zakulacená, žilnatinu tvoří 7 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 9mm. Květenstvím je úžlabní hrozen, listeny jsou šídlovité, vlastní květy jsou 4 - 5tičetné, bílé nebo nazelenalé, samčí velikosti 1,5 - 2mm na 1,5 - 2,5mm stopce, samičí velikosti 1mm na 0,8 - 1,2mm stopce, kališní lístky vejčité, korunní eliptické, podlouhlé nebo obvejčité. Plody jsou kulovité, červené, černě tečkované a průměru 5mm.

Embelia schimperi

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě keře nebo popínavky. Listy jsou obvejčité až kopinaté, špičaté, zpravidla podvinuté, lesklé, tmavězelené, v mládí i načervenalé, dlouhé 5 - 8 (i 11)cm, široké 3 - 4 (i 6,5)cm, spodní strana světlejší a báze klínovitá. Květenstvím je až 5cm dlouhý hrozen, vlastní květy jsou 4 - 5tičetné, zpravidla kroupnaté a občas narůžovělé. Plody jsou červené až růžovofialové.

Embelia scortechinii

Embelia sessiliflora

oblasti: Guizhou, Indie, Myanmar (Barma), Thajsko, Yunnan

Roste v Číně, Indii, Myanmaru a Thajsku v podobě šplhavého keře. Větve jsou v mládí hranaté, plstnaté a průměru 2 - 4mm. Listy jsou eliptické až podlouhlé, zašpičatělé, dlouhé 5 - 12cm, široké 2,2 - 4,5cm, báze zakulacená a sbíhavá, žilnatinu tvoří 18 - 27 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je vrcholové, dlouhé 5 - 30cm, listeny jsou vejčité až šídlovité, vlastní květy jsou 4 - 5tičetné, samčí velikosti 2,7 - 3,5mm, samičí 1,5 - 2mm, kališní lístky eliptické nebo podlouhlé a korunní bílé nebo nazelenalé. Plody jsou kulovité, červené a průměru 3 - 4mm.

Embelia singalangensis

Embelia sootepensis

Embelia spiraeoides

Embelia subcordata

Embelia subcoriacea

Embelia togoensis

Embelia tortuosa

Embelia tropophylla

Embelia tsjeriam-cottam

oblasti: Himálaj, Pákistán, Západní Bengálsko

Roste v Indii, Pakistánu a Himálaji v podobě vzpřímeného keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 15m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou mírně obvejčité, špičaté, na vrcholu drobně pilovité, mírně kožovité, dlouhé (5 -) 6 - 10 (i 13)cm, široké (2 -) 4 - 7cm, báze klínovitá, spodní strana bývá narůžovofialovělá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenstvím je úžlabní hrozen délky 2 - 6cm, vlastní květy jsou 5tičetné, mají 2 - 4mm stopku, kalich délky 1,5mm, kališní lístky délky 0,8mm, korunní lístky jsou eliptické a dlouhé 2,5 - 3mm. Plody jsou kulaté a průměru 4 - 5mm.

Embelia upembensis

Embelia urdanetensis

Embelia vaupelii

Embelia vestita

oblasti: Čína, Indie, Kambodža, Laos, Nepál, Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Kambodži, Indii, Laosu, Nepálu, Thajsku a Vietnamu v podobě šplhavého keře. Větve bývají zkroucené a průměru (1,5 -) 2 - 2,5 (i 4,5)mm. Listy jsou eliptické, podlouhlé (i obvejčité), špičaté, mohou být až kožovité, dlouhé (3,5 -) 4 - 18cm, široké (1,3 -) 1,8 - 7,5 (i 8)cm, báze špičatá nebo klínovitá, žilnatina bohatá a řapíky jsou dlouhé (0,4 -) 0,8 (i 2)cm. Květenstvím je 1 (i 2) postranní hrozny délky 1 - 6cm, listeny šídlovité, dlouhé (0,8 -) 1 - 1,1 (i 1,5)mm, vlastní květy jsou jednopohlavné nebo oboupohlavné, 4 - 5tičetné, nažloutlé nebo nazelenalé, mají (1,5 -) 2 - 3 (i 5)mm stopku, kališní lístky vejčité, korunní lístky jsou podlouhlé, eliptické až vejčité nebo lopatkovité a bílé nebo narůžovělé. Plody jsou kulovité, červené, černě tečkované a průměru (0,5 -) 0,8 - 1 (i 1,5)cm.

Embelia viridiflora

Embelia welwitschii

Embelia whitfordii

Embelia xylocarpa

Embelia zollingeri

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1780>

<https://www.rostliny.net/>