

Ericameria

čeleď: Asteraceae

Roste v Severní Americe v podobě stálezeleného keře nebo polokeře. Listy jsou čárkovité (i obvejčité nebo obkopinaté). Květenstvím je lata tvořená z úborů ve vrcholících nebo hroznech a vlastní květy jsou žluté.

Ericameria albida

Ericameria arborescens

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste v USA v podobě keře.

Ericameria arizonica

Ericameria bloomeri

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington

Roste v Severní Americe v podobě keře. Dorůstá výšky 20 - 90cm. Větvě jsou křehké. Listy jsou bohaté, žláznatě lepivé, čárkovité až úzce obkopinaté a dlouhé 2 - 6cm. Květenstvím je vrcholový žlutý úbor, může být bez anebo až s 5ti okvětními lístky.

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, nízká zálivka, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria brachylepis

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě keře.

Ericameria compacta

oblasti: Nevada

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky 15 - 50cm. Listy jsou obkopinaté až úzce kopist'ovité, špičaté až zašpičatělé, žláznaté a dlouhé 2 - 4cm. Květenstvím je lata nebo vrcholík složený ze žlutých úborů, zákrov je dlouze zvonkovitý a listeny jsou vejčité.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria cooperi

oblasti: Kalifornie, Nevada

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky 20 - 50cm. Listy jsou čárkovité, špičaté, ochlupené, žláznatě tečkované a dlouhé 0,3 - 1,5cm. Květenstvím je vrcholík tvořený ze žlutých úborů, zákrov je úzce zvonkovitý, listeny jsou podlouhlé až vejčité, tupé a okvětní lístky dlouhé 4 - 6mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria crispa

oblasti: Utah

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Listy jsou bohaté, kopinaté, zvlněné a oboustranně žláznaté. Květenství tvoří několik žlutých úborů se zvonkovitým zákrovem, listeny jsou vejčité a dlouhé 0,8 - 1,2cm.

Vyhovují mu hluboké dobře propustné půdy bohatší na živiny a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria cuneata

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko, Sierra Nevada (USA)

Roste v Severní Americe v pohoří Sierra Nevada v podobě keře. Dorůstá výšky 0,1 - 0,9 (i 1,5)m. Listy jsou husté, obkopinaté až obvejčité, tupé s hrotem, tmavězelené, dlouhé 0,5 - 1 (i 2)cm a báze je protáhlá. Květenstvím je žlutý úbor v kompaktním chocholíku a postrádá okvětní lístky.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria discoidea

oblasti: Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Wyoming

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Větvě jsou silné a plstnaté. Listy jsou podlouhlé nebo obkopinaté, žláznaté a dlouhé 1 - 3cm. Květenství tvoří 1 až několik žlutých úborů postrádajících okvětní lístky.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria ericoides

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě keře.

Ericameria fasciculata

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě keře nebo polokeře.

Ericameria gilmanii

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky 10 - 50cm. Větve jsou lepivé. Listy jsou bohaté, kopist'ovité, zpravidla svinuté a dlouhé 0,6 - 1,2cm. Květenstvím je 1 až několikavětý vrcholík ze žlutých úborů a má 4 - 6 okvětních lístků.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria greenei

oblasti: Idaho, Kalifornie, Oregon, Washington

Roste v USA v podobě keře nebo polokeře. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Větve jsou křehké. Listy jsou bohaté, mohou být žláznaté, obkopinaté až kopist'ovité a dlouhé 1,5 - 3,5cm. Květenstvím je žlutý vrcholový úbor a může mít max. 7 okvětních lístků délky 0,8 - 1,5cm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria juarezensis

Ericameria laricifolia

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko, Texas, Utah

Roste v USA v podobě keře nebo polokeře. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Listy jsou pryskyřičnaté, tečkované, čárkovité, špičaté, téměř válcovité a dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je vrcholík ze žlutých úborů s 3 - 11ti okvětními lístky.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria lignumviridis

oblasti: Utah

Roste v USA v podobě keře nebo polokeře. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Větve jsou v mládí zelené. Listy jsou pryskyřičnaté, obkopinaté, špičaté a dlouhé 0,7 - 3cm. Květenstvím je 3 - 8mikovětý vrcholík ze žlutých úborů, zákrov je obkruželovitý, listeny vejčité, špičaté, okvětních lístků je 5 - 8ks a mají délku 1 - 3cm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria linearifolia

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Utah

Roste v USA v podobě keře.

Ericameria linearis

oblasti: Montana, Wyoming

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Listy jsou čárkovité, špičaté, plstnaté, žláznaté a dlouhé 1 - 3cm. Květenstvím je 1 až několikačetný vrcholík ze žlutých úborů, zákrov je obkruželovitý, listeny podlouhlé až kopinaté a špičaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria martirensis

Ericameria nana

oblasti: Arizona, Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington

Roste v USA v podobě keře nebo polokeře. Dorůstá výšky 5 - 50cm. Listy jsou bohaté, pryskyřičnaté, čárkovité až úzce kopist'ovité, špičaté a dlouhé do 2cm. Květenstvím je listnatý vrcholík složený ze žlutých úborů s max. 8mi okvětními lístky.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria nauseosa

oblasti: Alberta, Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, New York, Nové Mexiko, Oklahoma, Oregon, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Washington, Wyoming

Roste v Severní Americe v podobě keře nebo polokeře. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. ammophila
- var. arenaria
- var. arta
- var. bernardina
- var. bigelovii
- var. ceruminosa
- subsp. consimilis
- var. graveolens
- var. hololeuca
- var. iridis - Utah; výška 10 - 20cm; stonky šedozelené; listy šedozelené, čárkovité, plstnaté, dlouhé 1,5 - 4cm, 1 žilka; úbor žlutý, zákrov velikosti 1,2 - 1,6cm, zákrovních listenů 20 - 26ks, vrchol špičatý až zašpičatělý
- var. juncea
- var. latisquamea
- var. leiosperma
- var. mohavensis
- var. nana - Idaho, Oregon, Washington; výška 10 - 30cm; stonky bělavé, plstnaté; listy tmavězelené až naředlé, nitkovité až čárkovité, plstnaté, dlouhé 3 - 4cm, 1 žilka; květenstvím je žlutý úbor, zákrov velikosti 1,4 - 1,8cm, listeny špičaté nebo tupé
- var. nauseosa
- var. nitida
- var. oreophila
- var. psilocarpa
- var. salicifolia
- var. speciosa
- var. texensis
- var. turbinata
- var. washoensis

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria obovata

oblasti: Utah

Roste v USA v podobě keře nebo polokeře. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Listy jsou žláznaté, obvejčité

až kopistovitě, tupé a dlouhé 1 - 3cm. Květenstvím je hrozen nebo vrcholík ze žlutých úborů, zákrov je obkruželovitý, listeny vejčité až eliptické, špičaté, mají 4 - 9 okvětních lístků s délkou 4 - 6mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria ophitidis

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Listy jsou čárkovité, zahnuté, špičaté a dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenstvím je samostatný žlutý úbor a zákrov má prakticky válcovitý v 5 - 6ti řadách.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria palmeri

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě keře.

Ericameria paniculata

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Utah

Roste v USA v podobě keře.

Ericameria parishii

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou obkopynaté až čárkovité, špičaté, dlouhé do 5cm a báze je protáhlá. Květenstvím je úbor ve vrcholovém chocholíku.

Ericameria parryi

oblasti: Arizona, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Wyoming

Roste v USA v podobě keře. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. affinis
- var. aspera
- var. attenuata

- var. howardii
- var. imula - Kalifornie; výška 10 - 20cm; listy husté, šedé, plstnaté, kopist'ovité, dlouhé 1 - 1,5cm, 1 žilné; květenství hroznovitě, 3 - 5tičetné, úbory žluté, zákrov velikosti 1 - 1,2cm
- var. latior
- var. monocephala
- var. Montana - Idaho, Montana; výška 10 - 20cm; větve bohaté; listy zelené, čárkovité, lepidité, dlouhé 2 - 3,5cm; květenstvím je 2 - 5tičetné, vrcholíčnaté, úbory žluté, zákrov velikosti 1 - 1,2cm, listeny chrupavčité, dlouze zašpičatělé
- var. nevadensis
- var. salmonensis
- var. vulcanica - Kalifornie; výška 10 - 20cm; listy zelené, čárkovité, drobně žláznatě tečkované, dlouhé 3 - 5cm a mají 1 - 3 žilky; květenstvím je 6 - 20tičetný hrozen nebo kytice, úbory žluté, zákrov velikosti 1,2 - 1,5cm, listeny chrupavčité a protáhlé

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria pinifolia

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě keře.

Ericameria resinosa

oblasti: Idaho, Oregon, Washington

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky 30 - 50cm. Větve jsou křehké a smolnaté. Listy jsou čárkovité a dlouhé 1 - 3mm. Květenstvím 1 až několikačetné vrcholové klubko, úbory jsou žluté až bělavé, mohou mít 3 - 7 okvětních lístků délky 3 - 6mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria sonorensis

oblasti: Sonora

Ericameria suffruticosa

oblasti: Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Oregon, Wyoming

Roste v USA v podobě keře nebo polokeře. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Listy jsou bohaté, obkopynaté nebo podlouhlé, zpravidla zvlněné a dlouhé 1 - 3,5cm. Květenstvím je 1 - několik žlutých vrcholových úborů s 3 - 8mi okvětními lístky délky do 2cm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria teretifolia

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada

Roste v USA v podobě keře.

Ericameria watsonii

oblasti: Arizona, Nevada, Utah

Roste v USA v podobě keře nebo polokeře. Dorůstá výšky 5 - 40cm. Listy jsou bohaté, husté, obkopinaté, hrotité, žláznaté a dlouhé 1 - 2,5cm. Květenstvím je samostatný vrcholový úbor s okvětními lístky délky do 1cm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria winwardii

oblasti: Idaho, Wyoming

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky 5 - 20cm. Listy jsou eliptické nebo obkopinaté, špičaté, plstnaté a dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenstvím je zpravidla samostatný žlutý úbor, zákrov je obkruželovitý, listeny kopianté a špičaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Ericameria x bolanderi

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě keře.

Ericameria x uintahensis

oblasti: Utah

Roste v USA v podobě keře.

Ericameria x viscosa

oblasti: Kalifornie, Nevada

Roste v USA v podobě keře.

Ericameria zionis

oblasti: Utah

Roste v USA v podobě keře nebo polokeře. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Listy jsou bohaté, čárkovité a jemně žláznaté. Květenstvím je samostatný vrcholový nebo úžlabní žlutý úbor.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1872>

<http://skalnicky.kadel.cz/genus/ericameria.html>

<https://www.rostliny.net/>