

Asimina triloba (Muďoul trojlaločný)

synonyma: *Annona pendula*, *Annona triloba*, *Asimina campaniflora*, *Asimina conoidea*, *Asimina glabra*, *Asimina virginiana*, *Porcelia triloba*, *Uvaria triloba*

čeleď: Annonaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste na východě a jihovýchodě USA v podobě cizosprašného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 14m (u nás 3 - 5)m v pyramidálním habitu. Pod zemí vytváří kúlový kořen. Borka je hnědá. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou úzce obvejčité, špičaté, dlouhé 10 - 30cm, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Kvete růžovofialovými květy o průměru 4 - 5cm, vnější korunní lístky jsou dlouhé 1,5 - 2,5cm, vnitřní jsou kratší. Plodem je žlutozelená až hnědá jedlá bobule délky 5 - 15cm s chutí podobnou směsi banánu, ananasu a manga. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Overelete' - částečně samosprašná
- 'Pennsylvania Golden'
- 'Prima 1216' - samosprašná
- 'Sunflower' - částečně samosprašná
- 'Taytwo'

Vyhovuje ji vlhká hluboká dobře propustná půda s pH 5,5 - 7, bohatá na živiny, teplo, chráněné místo a polostín. Odolává mrazu do -22°C.

Množí se semeny, které musí prodělat stratifikaci.

<https://www.rostliny.net/>